

أسباب الحبسة:

أسبابها راجعة أساسا إلى إصابة مناطق اللغة على مستوى الج.ع.م ومن أهمها:

1-الاصابة الوريدية المغذية للجهاز العصبي و التي تسمى La thrombose cérébrale : و التي تتميز بانسداد الأوردة المغذية للجهاز العصبي المركزي بواسطة thrombose، غالبا ما يحدث هذا الانسداد تدريجيا مع ظهور أعراض قليلة في البداية. وبعد بضعة أيام، يبدأ الصداع الدائم ويتفاقم تدريجيا، ثم قد تترافق مع أعراض أخرى مثل القيء أو نوبات الصرع. السبب الأكثر شيوعا هو التهابات المعدية الغير معالجة في مناطق الأنف والأذن والحنجرة أو مرض الدم الذي يساعد على تكوين جلطات (التخثر)، ولكن العديد من المشاكل الصحية يمكن أن تعزز في الواقع حدوث التهاب الوريد الخثاري الدماغي، مثل الجفاف، وصدمة الرأس، والحمى المطولة.

2- تصلب الجدار الوريدي Arthrose sclérose: تصلب الشرايين هو حالة تتطور تدريجيا على مر السنين ولا يسبب الانخفاض الطفيف أو المعتدل في قطر الشرايين أعراضا عادة.

هو تغير مرضي في الخواص الميكانيكية للجدار الوريدي، حيث يفقد مرونته الطبيعية ويصبح أكثر صلابة وسمكا. يحدث نتيجة لتغيرات في تركيب النسيج الضام (مثل الكولاجين والإيلاستين) داخل جدار الوريد

فعندما تصبح الأوردة الدماغية متصلبة، فإنها تفقد قدرتها على:

استيعاب تقلبات حجم الدم: عادة، عندما يزداد تدفق الدم الشرياني إلى الدماغ (مثل أثناء النشاط العقلي)، تتوسع الأوردة لاستيعاب الدم الزائد. مع الأوردة المتصلبة، لا يحدث هذا التوسع، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة.

تصريف الدم بشكل فعال: تصلب الجدار يعيق انقباض الأوردة (الذي يساعد في دفع الدم للأمام) ، مع حدوث ركود وريدي (بطء في التدفق)، مما يزيد من خطر الجلطات.

حماية النسيج الدماغي : الأوردة المتصلبة تكون أكثر عرضة للتمزق تحت الضغط، مما قد يؤدي إلى نزيف داخل الجمجمة .

3- الانسداد الدموي العصبي L'embolie cérébrale : وهو عبارة عن تشكيل كتلة من الدم

المتخثر في مكان على مستوى الدورة الدموية إثر مرض قلبي أو شرياني ، تنتقل هذه الكتلة إلى الأوردة الدماغية فتمنع وصول الدم إلى الدماغ.

يسبب الانسداد الدماغى سكتة دماغية إقفارية، أي بسبب انخفاض تدفق الدم إلى منطقة الدماغ. وينتج عن هذا الحادث طرق مختلفة: الشلل، وإلغاء الحساسية، واضطرابات اللغة، وحتى الوعي.

4- النزيف الدماغى: الناتج عن ارتفاع ضغط الدم في الأوردة hémorragie cérébrale إثر تمزق الوريد الدماغى الذي يؤدي إلى انتشار الدم في المناطق الدماغية.

لنزف داخل المخ هو نزيف بؤري من وعاء دموي في حمة الدماغ. والسبب هو ارتفاع ضغط الدم بشكل عام. تشمل الأعراض النموذجية عجزاً عصبياً بؤرياً، وغالباً ما يكون مصحوباً بصداغ مفاجئ وغثيان وتغير في الوعي.

5- ضيق الأوردة الدماغية: Rétrécissement des veines cérébrales يؤدي إلى منع التغذية الدموية في الدماغ مما يؤدي إلى تلف الخلايا العصبية.

عندما ينخفض حجم الأوعية الدموية، ينخفض تدفق الدم أيضاً. وفي الوقت نفسه، يتم رفع مقاومة أو قوة تدفق الدم، بسبب هذا ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المعالج إلى مشكلات صحية مع مرور الوقت، مثل: فقدان البصر، أو السكتة الدماغية، أو فشل القلب.

(الشرابين السباتية). ويزيد هذا الانسداد من احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية، وهي حالة طبية طارئة تحدث عندما تتوقف جميع إمدادات الدم أو أغلبها عن الوصول إلى الدماغ

6- الصدمات الدماغية Traumatisme crânienne : وهي التي تكون نتيجة لحوادث مرور أو أسباب أخرى تؤدي إلى إصابة الدماغ بصدمة أو إرتجاجات.

تسبب الصدمة القحفية الدماغية اضطراباً في حالة الوعي. اعتماداً على شدة الصدمة، تتراوح من ارتباك مؤقت بسيط إلى غيبوبة عميقة. يمكن أن يكون هذا التغيير في حالة الوعي قصير الأمد أو يستمر لعدة أيام أو حتى عدة أشهر.

7- الأورام **Les tumeurs** :خاصة عندما تكون على مستوى المناطق المسؤولة عن اللغة في الدماغ.

ورم المخ هو ورم ينمو داخل الجمجمة. هناك أنواع عديدة من أورام المخ، ويختلف تأثيرها وشدها بشكل كبير حسب: موقعها (نصفي الكرة المخية، المخيخ، جذع الدماغ، الغدة النخامية، السحايا، إلخ).

8- الأمراض التسممية.

9- الأمراض الانحلالية **Les maladies dégénératives** مثل الزهايمر و الباركنسون....

10- الأمراض الجرثومية ذات الأصل البكتيري (تعفنية).

11- الحوادث الوعائية الدماغية أو ما يسمى أيضا بالسكتة الدماغية **AVC**

السكتة الدماغية هي فقدان المفاجئ لوظائف المخ. هناك السكتات الدماغية والسكتات الدماغية النزفية. وغالبا ما تحدث في الأشخاص الذين لديهم عوامل الخطر، وتظهر في شكلين رئيسيين وهما:

Les AVC hémorragiques السكتات الدماغية النزفية:

في 20% من الحالات، تحدث السكتة الدماغية بسبب تمزق أحد الشرايين الدماغية، مما يسبب نزيفا في الدماغ. وهذا ما يسمى السكتة الدماغية النزفية.

Les AVC ischémiques السكتات الدماغية الإقفارية:

في أغلب الأحيان (80% من الحالات)، يكون توقف الدورة الدموية بسبب جلطة (أو انسداد) تسد الشريان المؤدي إلى الدماغ. نحن نتحدث عن السكتة الدماغية أو حتى احتشاء دماغي.