

# محاضرات في البرنامج الإحصائي SPSS

لطلبة الأقسام الزراعية  
السنة الدراسية الثالثة  
الكلية التقنية / المسيب

إعداد

د. رعد جعفر حسين

أستاذ مساعد

اقتصاد زراعي

2013-2012

**المقدمة:**

يعتبر برنامج SPSS من البرامج المهمة في التحليل الإحصائي حيث يستخدم من قبل الباحثين في المجالات التربوية والاجتماعية والفنية والهندسية والزراعية، وان SPSS هو مختصر للكلمات التالية:  
**(Statistical Package For Social Science)** وتعني في اللغة العربية **(الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية)** ويستخدم هذا البرنامج في إدخال البيانات (data) المختلفة وإجراء الحسابات الإحصائية عليها واستخراج رسوما بيانية إحصائية مستخدما أوامر شريط القوائم ومربعات الحوار. ان لهذا البرنامج احصائي اصدارات عديدة وهي متوافقة مع البرنامج التشغيلي المعروف (Microsoft windows) وسوف تعتمد محاضراتنا على البرنامج الإحصائي SPSS الاصدار 11 (SPSS var.11) وهو متوافق مع البرنامج التشغيلي (Microsoft windows 2003).

**كيفية تشغيل برنامج SPSS**

يمكن تشغيل برنامج SPSS بإحدى الطريقتين التاليتين:

- 1 - عن طريق النقر على قائمة start ثم التأشير على الأمر all programs ثم النقر على الاسم spss for windows.
- 2 - عن طريق النقر المزدوج على الأيقونة  الموجودة غالبا على سطح المكتب.

**أنواع الملفات التي يتكون منها برنامج SPSS :**

- 1 - ملفات البيانات data files: وهي الملفات إلي تحتوي على البيانات التي نقوم بإدخالها عن طريق نافذة محرر البيانات data editor لنجري عليها فيما بعد التحليل الإحصائي المطلوب. وان امتداد أسماء هذا النوع من الملفات هو (---.sav).
- 2 - ملفات المخرجات الإحصائية output files: وهي الملفات التي تحتوي على نتائج التحليل الإحصائي. وان امتداد أسماء هذا النوع من الملفات هو (---.spv).
- 3 - ملفات التعليمات syntax files: وهي ملفات التي تحتوي على الإجراءات أو الأوامر المكتوبة بلغة برمجة خاصة لكي تتمكنك من تنفيذ العمليات الإحصائية.
- 4 - ملفات برمجة خطوات البرنامج script files: وهي الملفات التي تحتوي على الإجراءات أو الأوامر المكتوبة بلغة برمجة تدعى sax basic.

**نوافذ برنامج SPSS:**

يحتوي البرنامج الإحصائي SPSS على نوافذ عديدة منها:

- نافذة محرر البيانات data editor : وهي نافذة تظهر تلقائيا عند بدء تشغيل البرنامج والتي من خلالها يتم إدخال البيانات إلى البرنامج ويتم تعريف كل نوع من أنواع البيانات المدخلة من خلال ورقة عمل منفصلة تتشابه إلى حد ما مع ورقة عمل برنامج excel، وتتكون نافذة محرر البيانات data editor في برنامج SPSS من الأجزاء الآتية:
- 1 - شريط العنوان title bar: يحمل اسم الملف المخزون عليه البيانات يتبعه العبارة SPSS data editor
  - 2 - شريط القوائم menu bar: يحتوي على أوامر خاصة بنافذة محرر البيانات للتعامل مع البيانات من حيث تعديلها أو تغييرها وكذلك يحتوي على أوامر أخرى خاصة بالتحليل الإحصائي.
  - 3 - شريط الأدوات القياسية standard tool bar: يمثل مختصر سريع للوصول إلى أهم الأوامر الموجودة في شريط القوائم.
  - 4 - شريط محرر الخلية cell editor bar: وهو شريط يتكون من جزئين ، الأول يمثل اسم الخلية أي رقم الصف ورمز العمود (اسم المتغير) والجزء الثاني يمكننا من خلاله إدخال البيانات إلى الخلية. كما إن نافذة محرر البيانات data editor تتكون من ورقتين الأولى تسمى عرض البيانات data view والثانية تسمى عرض المتغيرات variable view وهي كما يأتي:
- أولا :- ورقة عرض البيانات data view: تتكون هذه الورقة من اسطر تدعى cases وأعمدة تدعى variables والنقاء السطر بالعمود يدعى cell ويمكن من خلال خلايا الجدول إدخال البيانات عبر لوحة المفاتيح.

يمكن إدخال البيانات في هذه الورقة أما حسب المتغيرات **variables** أو حسب الحالات **cases** وذلك بالوقوف بالماوس على الخلية في أحد المتغيرات لتصبح الخلية فعالة **active cell** ثم إدخال القيم والضغط على مفتاح الإدخال **enter** أو مفاتيح الماوس والانتقال إلى الخلية الأخرى وهكذا.  
هكذا تظهر ورقة عرض البيانات **data view**:

Cars - SPSS Data Editor										
File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Window Help										
1 : mpg 18										
	mpg	engine	horse	weight	accel	year	origin	cylinder	filter_\$	var
1	18	307	130	3504	12	70	1	8	0	
2	15	350	165	3693	12	70	1	8	0	
3	18	318	150	3436	11	70	1	8	0	
4	16	304	150	3433	12	70	1	8	0	
5	17	302	140	3449	11	70	1	8	0	
6	15	429	198	4341	10	70	1	8	0	
7	14	454	220	4354	9	70	1	8	0	
8	14	440	215	4312	9	70	1	8	0	
9	14	455	225	4425	10	70	1	8	0	
10	15	390	190	3850	9	70	1	8	0	
11	.	133	115	3090	18	70	2	4	1	
12	.	350	165	4142	12	70	1	8	0	
13	.	351	153	4034	11	70	1	8	0	
14	.	383	175	4166	11	70	1	8	0	
15	.	360	175	3850	11	70	1	8	0	
16	15	383	170	3563	10	70	1	8	0	
17	14	340	160	3609	8	70	1	8	0	
18	.	302	140	3353	8	70	1	8	0	
19	15	400	150	3761	10	70	1	8	0	
20	14	455	225	3086	10	70	1	8	0	
21	24	113	95	2372	15	70	3	4	1	
22	22	198	95	2833	16	70	1	6	1	
23	18	199	97	2774	16	70	1	6	1	

ثانياً :- ورقة **variable view** : وهي عبارة عن صفحة مقسمة إلى عشرة أعمدة وأكثر من خمسين صفا خاصة بالمتغيرات أما الأعمدة فكل واحد منها يمثل وصفا معيناً لنوع واسم المتغير وطبيعة البيانات التي تخص ذلك المتغير والتي سوف نقوم بإدخالها في ورقة **data view** وهذه الأعمدة هي كما يأتي:-  
1- اسم المتغير **variable name**:- إن العمود الأول في هذه الورقة يحمل اسم (**name**) وهو خاص بكتابة اسم للمتغير حيث إن كل خلية في هذا العمود تخص أحد المتغيرات ومن المهم مراعاة النقاط التالية عند اختيار اسماً للمتغير وهي:-

أ- أن لا يزيد طول الاسم عن 8 رموز.  
ب- يجب أن يبدأ سم المتغير بحرف أما بقية الرموز فقد تكون أحرفاً أو أرقاماً أو نقطة أو بقية الرموز مثل @, #, ... الخ.

ج- يجب أن لا ينتهي الاسم بنقطة.

د- يجب أن لا يتضمن اسم المتغير فراغات أو بعض الرموز الخاصة مثل !, \*, ?

هـ - يمكن الكتابة بالأحرف الكبيرة أو الصغيرة لأسماء المتغيرات باللغة الانكليزية، كما يمكن كتابة

أسماء المتغيرات باللغة العربية مع مراعاة الشروط السابقة وذلك في بعض إصدارات برنامج **SPSS** ويفضل عدم استخدامها لأن البرنامج قد لا يتعرف عليها وخاصة في إظهار النتائج الخاصة الرسوم البيانية.

2- نوع المتغير **variable type**:- وهو العمود الثاني الذي يحمل اسم (**type**) ووظيفة هذا العمود

هو تحديد نوع البيانات التي سوف يتم إدخالها لهذا المتغير في ورقة **data view** وعند الوقوف عليه يظهر زر عند النقر عليه يظهر مربع حوار يحتوي على عدة أنواع من المتغيرات والتي نختار إحداها وهذه الأنواع هي:

أ- **numeric**: متغير عددي وهو النوع الافتراضي للمتغيرات في ورقة **data view**.

ب- **comma**: وهو متغير عددي مع إضافة فاصلة (,) الفصل بين كل ثلاث مراتب صحيحة مثلاً العدد

722667.123 يكتب 722,667.123 بموجب هذا النوع.

ج-dot: وهو متغير عددي مع استخدام (.) لفصل كل ثلاث مراتب صحيحة وتستخدم الفاصلة (,) للفصل بين الجزء الصحيح والجزء العشري فالعدد السابق يكتب على النحو التالي 722.667,123 بموجب هذا الاختيار.

د- scientific notation: وهو رمز مكتوب بصيغة التدوين اليائي E-notation مثلا العدد  $10^7$  يكتب  $1.0 E+07$  والعدد 1234 يكتب  $1.2 E+03$ .

هـ- Date: متغير يمثل التاريخ أو الوقت بالساعات على سبيل المثال.

و-dollar: يستعمل كرمز للدولار الأمريكي.


ز- custom currency: يستعمل لتعريف المستفيد للدالة على العملة، يمكن ضبطه من الاختيار :

Edit → option → current

ح-string: هو متغير رمزي (اسما مثلا) ويستعمل عندما يكون بيانات المتغير رموزا أو أسماء

وليس أعدادا.

أما المربع width: فيبين عدد مراتب المتغير والمربع decimal places: فيمثل عدد المراتب العشرية للمتغيرات العددية فقط. كما في الشكل التالي:



3- عرض المتغير variable width: إن عرض المتغير width هو نفسه الوارد في مربع الحوار variable type وهو العمود الثالث في ورقة variable view فيمثل عدد الرموز المخصصة للجزء العددي زائد رمز الفاصلة العشرية وما يتبقى من الرموز تخصص للعدد الصحيح في حالة المتغيرات العددية أما بالنسبة للمتغيرات غير العددية فيمثل عرض المتغير عدد الرموز المخصصة للمتغير غير العددي.

4- عدد المراتب العشرية decimals: يمثل عدد المراتب العشرية المخصصة للكسر العشري في المتغيرات العددية (dot, comma, numeric) يمكن زيادة أو إنقاص المراتب العشرية بواسطة الأسهم إلى أعلى وإلى أسفل علما إن المراتب العشرية يمكن تحديدها من مربع الحوار variable type أيضا.


5- عنوان المتغير Label: يمكن أن يغطي المتغير عنوانا يصل إلى 256 رمزا يستعمل لوصف المتغير حيث يستعمل العنوان هذا بدلا من اسم المتغير في مخرجات (جداول) برنامج SPSS.

6- عنوان القيمة Value labels: أحيانا تبرز الحاجة إلى تعيين عنوان للقيمة كون المتغير يستعمل قيما عددية للتعبير عن قيم غير عددية مثلا يستعمل الرقم 1 للتعبير عن الذكور males والرقم 2 للتعبير عن الإناث females، أو احرف بدل الكلمات.


ويظهر مربع الحوار الخاص بهذا الأمر كما في الصورة أدناه:

حيث نكتب في خانة value الرقم أو الحرف، وفي خانة value label نكتب الكلمة أو العبارة ثم

ننقر مفتاح Add فيضاف الرقم والرمز الدال عليه.



7- تعريف القيم المفقودة Missing values:- أحيانا نرغب في تعريف بعض القيم المفقودة أي إن هذه القيم موجودة أصلا ولكننا لا نرغب إدخالها في التحليل الإحصائي كونها قيم لا نريد إدخالها في التحليل الإحصائي، أو أنها أساسا غير موجودة. ويظهر مربع الحوار الخاص بهذا الأمر كما في الصورة أدناه:



8- عرض العمود Column width :- يمكن تحديد عرض العمود لمتغير معين بالوقوف على الخلية الواقعة ضمن العمود column في ورقة variable view حيث يمكن زيادة أو تقليل عرض العمود بواسطة الأسهم إلى أعلى أو أسفل (أو كتابة عرض العمود مباشرة).

9- محاذاة النص Alignment:- لضبط محاذاة النص داخل خلايا المتغير نختار العمود الذي يحمل اسم align في ورقة variable view ونختار احد الأوامر التالية:  
Left: لمحاذاة النص إلى يسار الخلية.  
Center: لمحاذاة النص في وسط الخلية.  
Right: لمحاذاة النص إلى يمين الخلية.

10- القياس Measurement:- من اجل تعريف مقياس متغير معين انقر خلية المتغير التي تقع ضمن عمود measure في ورقة variable view حيث يظهر ثلاثة خيارات هي كما يأتي :  
أ-scale : يستعمل للبيانات العددية (القابلة للقياس الكمي) كمتغيرات الطول والوزن...الخ.  
ب-ordinal: يستعمل لقياس التغيرات الترتيبية عندما يكون المتغير ذو عدد محدد من الفئات يمكن ترتيبها تصاعديا أو تنازليا ولكن لا يمكن تحديد الفروق بينها بدقة مثل تقديرات الطالب في الامتحانات (ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، مقبول، ضعيف).

ج-nominal: ويستعمل لقياس المتغيرات الاسمية وهي متغيرات لها عدد من الفئات دون أفضلية لأحدها على الآخر (لا يمكن ترتيبها تصاعديا) مثل تقسيم المجتمع إلى ذكور وإناث فمثلا إذا رمزنا بالرقم 1 للذكور والرقم 2 للإناث فان هذين الرقمين لا يعطيان المعنى الحقيقي لهذا المتغير ولا يمكن إجراء العمليات

الحسابية على هذا النوع من المتغيرات ويمكن أن يكون هذا النوع من المتغيرات عددياً أو رمزيًا مثلًا متغير المحافظة (بغداد، موصل، بصرة) نستعمل معه nominal لعدم إمكانية ترتيب المحافظات بأسبوعية معينة. وهكذا تظهر ورقة variable view:

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
1	mpg	Numeric	4	0	Miles per Gallo	None	None	8	Right	Scale
2	engine	Numeric	5	0	Engine Displac	None	None	8	Right	Scale
3	horse	Numeric	5	0	Horsepower	None	None	8	Right	Scale
4	weight	Numeric	4	0	Vehicle Weigh	None	None	8	Right	Scale
5	accel	Numeric	4	0	Time to Accele	None	None	8	Right	Scale
6	year	Numeric	2	0	Model Year (m	None	None	8	Right	Ordinal
7	origin	Numeric	1	0	Country of Orig	{1, American}.	None	8	Right	Ordinal
8	cylinder	Numeric	1	0	Number of Cyl	{3, 3 Cylinders	None	8	Right	Ordinal
9	filter_ \$	Numeric	1	0	cylrec = 1   cyl	{0, Not Selecte	None	8	Right	Ordinal
10										
11										
12										

### تمارين:

تمرين 1- في برنامج spss اكتب مواصفات المتغير التالي في ورقة variable view:  
 أ - اسم المتغير: nop  
 ب - بيانات هذا المتغير هي أسماء وان اكبر اسم فيها يتكون من 11 حرف  
 ت - عنوان المتغير: name of product  
 ث - تظهر البيانات في data view في وسط عمود المتغير

تمرين 2- في برنامج spss اكتب مواصفات المتغير التالي في ورقة variable view:  
 أ-اسم المتغير qop  
 ب-بيانات هذا المتغير أرقام مكونة من 5 مراتب صحيحة تفصلها فارزة و 3 مراتب عشرية.  
 ت-عنوان المتغير: quantity of product  
 ث-تظهر البيانات في data view في يسار عمود المتغير

تمرين 3- في برنامج spss هل تصلح العبارات التالية أن تستخدم كأسماء متغيرات ولماذا؟!

- 1- prod.
- 2- 3varlues
- 3- statistical
- 4- milk production
- 5- quantity

تمرين 4- الجدول التالي يمثل ثلاثة متغيرات والمطلوب إدخال معلومات هذه المتغيرات في ورقة data view وتحديد مواصفات كل متغير من خلال ورقة variable view في برنامج spss مع مراعاة ما يأتي:

- اسم المتغير الأول name of student يرمز له nost
- كلمة male تأخذ الحرف M

- كلمة female تأخذ الحرف F
- كلمة low تأخذ رقم 1
- كلمة acceptable تأخذ رقم 2
- كلمة Medium تأخذ رقم 3
- كلمة Good تأخذ رقم 4
- كلمة Very good تأخذ رقم 5
- كلمة excellent تأخذ رقم 6

Name of student	gender	estimate
Ahmed	Male	Medium
Ayad	Male	Acceptable
loobna	Female	Low
Mahdi	Male	Good
Salma	Female	Excellent
Imad	Male	Very good
Zenab	Female	Medium
Suad	Female	Good
Ali	Male	Acceptable
Noora	female	Excellent

### حفظ البيانات:

لحفظ ملف البيانات في برنامج SPSS نختار القائمة file من شريط القوائم لنختار الأمر save as فيظهر مربع حوار فنقوم بكتابة اسم الملف في المستطيل file name ثم ننقر مفتاح save فيتم حفظ الملف بالاسم الذي تم اختياره وله امتداد (---.sav)، أما لفتح ملف البيانات محفوظ سابقاً، نختار من قائمة file من شريط القوائم الأمر open لنختار منه الأمر data ليظهر لنا مربع حوار بعنوان open file نختار منه الملف المطلوب عرضه وذلك بالنقر عليه ثم النقر على مفتاح open في مربع الحوار. أما لفتح ملف بيانات جديد نختار من خلال القائمة file من شريط القوائم الأمر new لنختار منه الأمر data فتظهر لنا ورقة عمل جديدة data view.

### العمليات على المتغيرات وصفاتها في ورقة data view:

- 1- لاختيار select (تحديد أو تظليل) متغير variable انقر الخلية الحاوية على اسم المتغير في أعلى العمود في ورقة data view بزر الماوس الأيسر.
- 2- لاختيار حالة case بأكمله انقر الخلية الحاوية على رقم الحالة في ورقة data view بزر الماوس الأيسر.
- 3- لاختيار مجموعة من المتغيرات المتجاورة:
  - أ- انقر الخلية الحاوية على اسم المتغير الأول.
  - ب- انقر الخلية الحاوية على اسم المتغير الأخير بعد ضغط مفتاح shift.
- 4- لاختيار مجموعة من المتغيرات المتباعدة:
  - أ- انقر بزر الماوس الأيسر الخلية الحاوية على اسم المتغير الأول لاختياره.
  - ب- انقر الخلية الحاوية على اسم المتغير الثاني بعد ضغط مفتاح ctrl لاختياره وهكذا يتم اختيار بقية المتغيرات.

- 5- بنفس الطريقة المستخدمة لاختيار مجموعة من المتغيرات المتجاورة أو غير المتجاورة يمكن استعمالها لاختيار مجموعة من الحالات cases المتجاورة أو غير المتجاورة
- 6- لإضافة متغير جديد بين متغيرين موجودين في data view.
- انقر بزر الماوس الأيسر اسم المتغير (أو أي خلية من خلايا المتغير) الذي يقع إلى يمين الموقع المراد إضافة المتغير الجديد إليه بعدها يمكن إضافة متغير بعدة طرق منها: انقر اسم المتغير الذي يقع إلى يمين الموقع المراد إضافة المتغير الجديد إليه بزر الماوس الأيمن فتظهر قائمة مختصرة short list ومنها نختار الأمر insert variables فيضاف متغير جديد إلى يسار المتغير الحالي.
- 7- بنفس الطريقة يمكن إضافة حالة case فوق (أعلى) حالة موجودة (بعد تحديدها).
- 8- لحذف متغير.
- أ- انقر اسم المتغير في ورقة data view بزر الماوس الأيسر لاختياره.
- ب- انقر اسم المتغير بزر الماوس الأيمن فتظهر قائمة مختصرة short list ومنها نختار الأمر clear فيتم حذف المتغير.
- 9- وبنفس الطريقة السابقة يمكن حذف الحالة case
- 10- لعمل نسخة من متغير معين نختار إحدى الطريقتين التاليتين:
- أ- من خلال قائمة edit نختار الأمر copy بعد النقر على اسم المتغير ثم يتم تحديد اسم المتغير الآخر واختيار الأمر past من نفس القائمة
- ب- انقر اسم المتغير المراد نسخه بزر الماوس الأيمن لإظهار القائمة المختصرة short list ثم اختر الأمر copy بعد ذلك انقر اسم المتغير الآخر بزر الماوس الأيمن ثم اختار paste من القائمة المختصرة
- 11- لتغيير موضع متغير معين اتبع نفس الخطوات في 10 مع استخدام cut بدلا من copy
- 12- للانتقال إلى حالة معينة نختار من قائمة data ثم الأمر go to case ليظهر لنا مربع حوار الخاص بالأمر نقوم بإدخال رقم الحالة ونقر ok ليتم الانتقال إلى الحالة المطلوبة كما يمكن انجاز العملية من خلال الأيقونة الخاصة الموجودة في شريط الأدوات.


### تمرين:-

- اكتب أسماء 5 متغيرات رقمية وادخل في كل متغير 10 أرقام افتراضية بعد ذلك قم بإجراء ما يأتي:
- أ - select (تحديد أو تظليل) المتغير الثالث.
- ب - select (تحديد أو تظليل) الحالة الرابعة.
- ت -select (تحديد أو تظليل) المتغيرات الثاني والثالث والرابع.
- ث - select (تحديد أو تظليل) الحالات الأولى والثانية والثالثة.
- ج - Select (تحديد أو تظليل) المتغير الأول والثالث والخامس.
- ح - select (تحديد أو تظليل) الحالة الرابعة والسادسة والثامنة والعاشر.
- خ - أضف متغير جديد بين المتغيرين الثالث والرابع.
- د - أضف حالة جديدة بين الحالة السابع والثامنة.
- ذ - احذف المتغير الثالث.
- ر - احذف الحالة الرابعة.



**الأوامر المهمة التي تحتويها القوائم المختلفة في شريط القوائم للبرنامج SPSS****أولا :- أوامر القائمة view:**

في أدناه صور لأوامر قائمة View:



يمكن أنجاز فعاليا مختلفة باستخدام قائمة view من خلال وضع او رفع علامة الصح (√) الى يسار الامر، والتي تظم عدد من الأوامر منها:


- 1- الأمر status bar: لعرض شريط الحالة (أسفل الشاشة) عند نقره بزر الماوس الأيسر.
- 2- الأمر font: لتغيير حجم ونوع الخط المستعمل عند الكتابة في شاشة data editor فعند نقر الأمر font بزر الماوس الأيسر يظهر مربع حوار يحتوي على أنواع وأحجام الخطوط فنختار منها ما هو مناسب ثم ننقر مفتاح ok
- 3- الأمر grid lines: لعرض خطوط الشبكة في data editor.
- 4- الأمر value labels: لعرض عناوين القيم لمتغير ما (في حالة تعريفها).
- 5- الأمر variables: للانتقال إلى ورقة variable view وبالعكس أي الرجوع إلى ورقة data view.
- 6- الأمر toolbars: يستعمل هذا الأمر لتحقيق احد هدفين:  
أ- إضافة أيقونات إلى شريط الأدوات القياسي standard toolbar  
ب- إنشاء شريط أدوات جديد (غير القياسي).

**تمارين :-**

- تمرين 1- احذف ثم ارجع شريط الحالة status bar.
- تمرين 2- اختر نوع الخط simplified Arabic وحجم الخط 16.
- تمرين 3- احذف ثم ارجع خطوط الشبكة الخاصة بورقة data view.
- تمرين 4- من خلال أوامر هذه القائمة انتقل إلى ورقة variable view بعد ذلك العودة إلى ورقة data view.

**ثانياً :- أوامر القائمة data:**


في أدناه صورة لأوامر القائمة Data:



تظم القائمة data على كثير من الأوامر منها:

1 - الأمر define date: يقوم هذا الأمر بتوليد متغيرات التاريخ date variables التي تستعمل كتاريخ لقيم السلسلة الزمنية فقط. حيث يظهر مربع حوار يحتوي على قائمة من أشكال التاريخ فنختار ما هو مناسب مع تحديد السنة ورقم الفصل ورقم الشهر للقيمة الأولى للمتغير محل الدراسة. فيعد تحديد مواصفات المتغير في ورقة variable view نقوم بإدخال البيانات الخاصة به في ورقة data view ونتبع الخطوات التالية:

من شريط القوائم نختار define dates → data فيظهر مربع الحوار الخاص به:



فنختار من خانة قائمة التواريخ (cases are) الأمر المطلوب لتنظيم البيانات على اساسه وفي خانة (first case to:) نحدد بداية التاريخ المطلوب ترتيب البيانات على اساسه، ثم ننقر مفتاح (ok) فتظهر البيانات الجديدة على شكل متغيرات بجوار متغير البيانات.


2- الأمر insert variable: يستعمل لإضافة متغير variable جديد إلى يسار المؤشر في data editor.

3- الأمر insert case: يستعمل لإضافة حالة case أعلى المؤشر في data editor.

4- الأمر go to case: يستعمل للذهاب إلى حالة معينة case بعد تحديد رقمها.

5- الأمر sort cases: يستعمل لترتيب حالات cases ملف ما ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً حسب متغير (أو متغيرات)، لترتيب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً حسب احد المتغيرات نتبع الخطوات التالية:

من شريط القوائم نختار sort cases → data فيظهر مربع حوار التالي:




حيث يحتوي الجانب الأيسر منه المتغيرات والأيمن خانة تسمى **sort by:** ننقل المتغير المطلوب إليها عن طريق السهم موجود بين الجانبين، وأسفل الخانة اليمنى يوجد خيارين الأول **ascending** ويعني ترتيب تصاعدي، والأخر **descending** يعني ترتيب تنازلي فنحدد احدهما حسب ما هو مطلوب؛ ثم نقر المفتاح **ok** فيتم ترتيب البيانات على وفق المتغير المحدد، وهكذا من الممكن ترتيب اي عدد من المتغيرات تصاعدياً أو تنازلياً بنفس الخطوات السابقة.

6- الأمر **transpose**: يستعمل لقلب الصفوف إلى أعمدة وبالعكس أي تحويل **variables** إلى **cases** وبالعكس.

لتنفيذ الامر نتبع الخطوات التالية:

من شريط القوائم اختر: **Data → transpose** يظهر مربع حوار **transpose** الآتي :



فننقل المتغيرات (الرقمية في الغالب) إلى خانة **variable (s)** أما المتغير الآخر (اسمي في الغالب) فننقل إلى خانة **name variable:** ، وعند نقر زر **ok** يتم الحصول على مبدلة المصفوفة وتظهر في شاشة **data editor**. وان **case\_lbl** هو متغير رمزي يتكون تلقائياً ويمثل أسماء المتغيرات القديمة (أعمدة المصفوفة قبل استخراج المبدلة).

7- دمج الملفات **merge files**: يستعمل هذا الأمر لدمج ملفين وهذه العملية مهمة جداً في حالة استخدام برنامج **SPSS** كقاعدة بيانات ويمكن أن يتم الدمج بإحدى الطريقتين:

أ - إضافة حالات **Add cases**: هذا الأمر يتيح دمج ملفين يحتويان نفس المتغيرات وحالات مختلفة مثلاً دمج ملف درجات طالبة شعبة أ مع ملف درجات طالبة شعبة ب حيث يتشابه الملفان من حيث الدروس ويختلفان من حيث الطلبة في كل شعبة (حالات).

لدمج الملفين في المواد المشتركة نتبع الخطوات التالية:

افتح احد الملفين (بالأمر **open**)

من شريط القوائم اختر **data → merge files → add cases**

فيظهر مربع حوار **add cases: read files** خاص بفتح الملف المطلوب ومنه نختار الملف الاخر

عند نقر زر open يظهر مربع حوار مكون من جزئين، الأول: unpaired variables وهو مخصص لجميع المتغيرات في كلا الملفين والثاني ويسمى:

variables in new working data file:

تحتوي هذه الخانة على المتغيرات المتشابهة في كلا الملفين. عند النقر على زر ok تندمج بيانات الملفين للمتغيرات المتشابهة.

ب إضافة متغيرات Add variables: يتيح هذا الأمر إمكانية دمج الملف العامل (الحالي) مع ملف خارجي واللذان يحتويان نفس الحالات ولكن متغيرات مختلفة، مثلاً ملف يحتوي على درجات عدد من الطلاب في مواد معينة وملف آخر يحتوي على أسماء نفس الطلبة ولكن في مواد أخرى.

لدمج الملفين (إضافة متغيرات الملف الثاني إلى متغيرات الملف الأول) نتبع الخطوات التالية:

➤ افتح الملف المخزون سابقاً بالأمر open من قائمة file.


➤ من شريط القوائم اختر add variables → merge files → data فيظهر مربع حوار add variables form والذي يحتوي على جزئين الأول يسمى excluded variables والجزء الآخر new working file: وقد انتقلت إليه جميع المتغيرات.

➤ عند نقر زر ok في مربع الحوار add variables form يظهر الملف الناتج عن عملية الدمج .

8 - فصل (تجزئة الملفات) split files: يستعمل هذا الأمر لغرض تجزئة (فصل) ملف البيانات لأغراض التحليل الإحصائي.

➤ من شريط القوائم نختار data → split file

➤ يظهر مربع حوار split file الآتي:




➤ نقوم بتأشير خانة الاختيار organize output by groups وكذلك الاختيار sort this file by grouping variables

➤ ثم نقوم بنقل المتغير المراد التجزئة على أساسه من الخانة التي تحتوي على المتغيرات إلى الخانة المجاورة: groups based on: ثم ننقر الزر ok فتظهر النتائج .

9- تجميع البيانات aggregate data: يستعمل هذا الأمر لتلخيص المعلومات المتعلقة بمجموعة من الحالات cases في حالة تجميعية واحدة وتكون ملف تجميعي جديد. فعلى سبيل المثال إذا توفرت قائمة تحتوي معدلات الطلاب لمجموعة من المدارس فقد نرغب في التعامل مع المدرسة (باعتبارها وحدة العد الإحصائي) بدلاً من الطالب فيمكن إن نعرض الوسط الحسابي لمعدلات الطلاب في كل مدرسة أو الانحراف المعياري مثلاً في ملف تجميعي جديد بدلاً من عرض معدلات جميع الطلاب لكافة المدارس.

من شريط القوائم نختار data → aggregate data فيظهر مربع حوار



وتكون جميع المتغيرات في الجانب الأيسر من مربع الحوار.  
 \*نقل المتغير المطلوبة التجميع على اساسه إلى خانة break (تستخدم هذه الخانة لتعريف المجاميع).  
 \*وننقل المتغير الاخر إلى خانة: aggregate variable(s) (تستخدم هذه الخانة في تجميع الحالات).  
 \*عند نقر زر ok يتم تكوين وخرن الملف التجميعي AGGR، لقراءة محتوياته يتوجب فتحه على النحو التالي:  
 File → open → data → aggr

ويظهر الملف .

10- اختيار الحالات select cases: يفيد هذا الأمر في اختيار جزء من الحالات لتضمينها في التحليل الإحصائي.

11- ترجيح الحالات weight cases: يبيح هذا الأمر إمكانية إعطاء أوزان لحالات cases ملف معين نظرا لاختلافها من ناحية الأهمية النسبية.

## تمارين على بعض أوامر القائمة data:

### تمرين 1:

المتغير revenue يمثل عائدات منشأة معينة وهي كما يأتي:  
 117, 120, 130, 145, 150, 190, 220, 250, 243, 257, 260, 340, 360, 362, 380,  
 340, 350, 420, 389, 400 والمطلوب تعريف التاريخ للمتغير revenue:

- 1- حسب السنة اعتبارا من سنة 1990
- 2 - حسب السنة والشهر اعتبارا من شهر تموز 2007
- 3 - حسب السنة والفصل والشهر اعتبارا من شهر ايلول 2006
- 4 - حسب الاسبوع واليوم اعتبارا من يوم الخميس من الاسبوع الخامس عشر

### تمرين 2:

الملف salary يحتوي أسماء مجموعة من الموظفين ودرجاتهم الوظيفية degree والأجر الشهري salary والمطلوب:

- a- ترتيب البيانات تصاعديا حسب الأجر الشهري salary
- b- ترتيب البيانات تنازليا حسب الدرجة degree و الأجر الشهري salary
- c- ترتيب البيانات تصاعديا حسب الاسم name

name	degree	salary
AHMAD	3	40
SAMER	3	35
LOAY	3	50
MAHMOOD	1	80
AYAD	1	70
YASSIN	2	66
SATAR	1	85
RAZAK	1	77
KAMAL	2	59
ABAS	3	45
MAHDI	1	90
SALIM	2	62
SABAH	2	57
FALAH	2	55
IMAD	1	82

### تمرين 3 على الأمر transpose:

الملف التالي يحتوي المصفوفة المعرفة أعمدها بالمتغيرات X1,X2,X3 إضافة إلى متغير تسمية Y وقد أدخلت البيانات في شاشة data editor وكما يلي:

X1	X2	X3	Y
3	6	9	Y1
4	7	10	Y2
5	8	11	y3

المطلوب إيجاد المبدلة للمصفوفة X وتسمية أعمدها بالمتغير Y.

### تمرين 4 على إضافة حالات add cases:

الملف group1 يحتوي درجات طالبين (حالتين cases) في أربع مواد (متغيرات variables). الملف group2 يحتوي درجات ثلاثة طلاب (حالات cases) في أربع مواد (متغيرات variables) علما أن الملفين يختلفان في إحدى المواد

المطلوب: 1- دمج الملفين في المواد المشتركة فقط.

2- دمج الملفين لجميع المواد في كلا الملفين.

حيث يظهر الملفين على النحو التالي:

#### Group 1

name	math	chem	physic	music
Samir	100	90	95	87
Lubna	95	87	90	85

## Group 2

name	math	chem	physic	paint
Yousif	85	90	77	88
Ammar	95	83	82	90
Sinan	90	92	86	95

## تمرين 5 على إضافة متغيرات add variables:

الملف group1 يحتوي درجات طالبين في أربع مواد والملف sub2 يحتوي درجات نفس الطالبين في مادتين أخريتين. المطلوب دمج هذين الملفين. علما أن بيانات الملفين هي كما يلي:

## Group 1

name	math	chem	physic	music
Samir	100	90	95	87
Lubna	95	87	90	85

## Sub 2

name	Arabic	English
Samir	80	98
Lubna	85	95

## تمرين 6 على فصل (تجزئة الملفات) split files:

الجدول التالي يمثل رواتب wage مجموعة من الأشخاص حسب الجنس gender والمطلوب تجزئة الملف إلى جزئين الأول يمثل رواتب الذكور m والثاني يمثل رواتب الإناث f

wage	gender
60	M
30	F
70	M
35	F

65	M
40	F

### تمرين 7 على فصل (تجزئة الملفات) split files:

الجدول التالي يبين إنتاج الحليب في سنتي (2000، 2001) وحسب المناطق (شمالية، جنوبية).  
المطلوب تجزئة الملف (متغير إنتاج الحليب prodmilk) حسب السنة والمنطقة

prodmilk	year	region
800	2000	N
600	2000	S
1400	2001	N
900	2000	N
1090	2001	S
950	2000	N
1350	2001	N
1180	2001	S
700	2000	S
975	2000	N
1290	2001	N
1000	2001	S
750	2000	S
1310	2001	N
1150	2001	s

### تمرين رقم 8:

في أدناه جدول بأسماء و درجات عدد من طلبة الاقسام الزراعية في الكلية التقنية المسيب والمطلوب ترتيب الاقسام العلمي تصاعديا حسب المعدل درجات طلبته:

Department	Name of student	Degree
SOIL AND WATER TECHNIQUES	MC.	90
ANIMAL PRODUCTION TECHNIQUES	HA.	80
PLANT PRODUCTION TECHNIQUES	SV.	75
BIO-RESISTANCE TECHNIQUES	SS.	85
SOIL AND WATER TECHNIQUES	RA.	80
SOIL AND WATER TECHNIQUES	AM.	60
PLANT PRODUCTION TECHNIQUES	SR.	75
ANIMAL PRODUCTION TECHNIQUES	RP.	77
PLANT PRODUCTION TECHNIQUES	ZI.	95
BIO-RESISTANCE TECHNIQUES	WX.	88
BIO-RESISTANCE TECHNIQUES	XR.	74
SOIL AND WATER TECHNIQUES	YS.	91
BIO-RESISTANCE TECHNIQUES	RM.	87



PLANT PRODUCTION TECHNIQUES	SR.	75
PLANT PRODUCTION TECHNIQUES	MN.	70
ANIMAL PRODUCTION TECHNIQUES	OP.	80
SOIL AND WATER TECHNIQUES	PQ.	84
PLANT PRODUCTION TECHNIQUES	OM.	83
BIO-RESISTANCE TECHNIQUES	NR.	99
ANIMAL PRODUCTION TECHNIQUES	AB.	69
SOIL AND WATER TECHNIQUES	BC.	77
ANIMAL PRODUCTION TECHNIQUES	DE.	81
ANIMAL PRODUCTION TECHNIQUES	FG.	89
SOIL AND WATER TECHNIQUES	HI.	93
ANIMAL PRODUCTION TECHNIQUES	PX.	91
PLANT PRODUCTION TECHNIQUES	VY.	80
BIO-RESISTANCE TECHNIQUES	XW.	65
BIO-RESISTANCE TECHNIQUES	ZR.	93

### تمرين 9 على تجميع البيانات aggregate data:


الملف salary يحتوي أسماء مجموعة من الموظفين ودرجاتهم الوظيفية degree والأجر الشهري salary وكما يظهر في شاشة data editor والمطلوب تجميع متغير الراتب (استخراج المتوسط الحسابي) حسب الدرجة الوظيفية.

الملف salary		
name	degree	salary
AHMAD	3	40
SAMER	3	35
LOAY	3	50
MAHMOOD	1	80
AYAD	1	70
YASSIN	2	66
SATAR	1	85
RAZAK	1	77
KAMAL	2	59
ABAS	3	45
MAHDI	1	90
SALIM	2	62
SABAH	2	57
FALAH	2	55
IMAD	1	82

**ثالثاً:- أوامر القائمة Transform:-**

إن الباحث حين يقوم بإدخال البيانات الإحصائية إلى برنامج SPSS يكون قد أنجز جزءاً مهماً من عمله ولكن قد تكون البيانات التي تم إدخالها قد لا تتناسب مع نوع التحليل الإحصائي المطلوب لذا فإن من خلال أوامر قائمة Transform يمكن إنجاز بعض العمليات على البيانات لكي تتلائم مع التحليل الإحصائي المطلوب، وان أوامر هذه القائمة هي كما يأتي:-

- 1- الأمر Compute : يتيح هذا الأمر إمكانية حساب متغيرات جديدة باستخدام أكثر من 70 دالة تتضمن (دوال حسابية، إحصائية، توزيعات احتمالية).
  - 2- الأمر Random Number Seed: يستعمل لتوليد الأعداد العشوائية.
  - 3- الأمر Count: أن لهذا الأمر أهمية خاصة في الاستبيانات الإحصائية لحساب عدد مرات تكرار نفس القيمة لمجموعة من المتغيرات ولكل حالة.
  - 4- الأمر Recode: يستفاد من هذا الأمر في إعطاء code (رمز) لكل قيمة من قيم متغير ما حيث يستفاد منها في عمل الفئات ويتضمن الأمر نوعين من الترميز:
    - أ- الأمر into same variables: يستفاد من هذا الأمر في تكوين متغير جديد قيمه عبارة عن رموز لقيم متغير قديم ويأخذ هذا المتغير نفس اسم المتغير القديم.
    - ب- الأمر into different variables: يمكن هذا الأمر من إعطاء رموز لمتغير ما و تخزينها في متغير آخر مع الحفاظ على المتغير القديم.
  - 5- الأمر categorize variables (تبويب المتغيرات): أن هذا الأمر يقوم بتحويل متغير معين إلى عدد منفصل من الفئات حسب الرقم الذي نحدده لعدد الفئات.
  - 6- الأمر Rank cases : يمكن بواسطة هذا الأمر تكوين متغيرات هي عبارة عن رتب لمتغيرات معين وتكون هذه الرتب تصاعدية أو تنازلية. كما يمكن إعطاء رتب لمتغير معين بواسطة متغيرات أخرى.
  - 7- الأمر Automatic Recode (الترميز التلقائي): باستخدام فعالية الترميز التلقائي يمكن تكوين متغير جديد قيمته عبارة عن أعداد متعاقبة (تصاعدية أو تنازلية) للمتغير القديم (سواء كانت متغيرات عددية أم رمزية)
  - 8- الأمر create time series: هذا الأمر خاص بالسلاسل الزمنية حيث يمكن من خلاله إجراء بعض العمليات الإحصائية مثل: الفروق differences، المعدلات المتحركة moving average، الوسيطات المتحركة running medians، وغيرها.
  - 9- الأمر replace missing values: يستخدم هذا الأمر لتقدير القيم المفقودة من أجل إكمال تطبيق أسلوب إحصائية معين.
- إن وجود قيم مفقودة لبعض المتغيرات تعتبر أحياناً مشكلة كبيرة تواجه تطبيق أسلوب إحصائي معين ويتوجب في هذه الحالة تقدير القيمة المفقودة حيث يوفر برنامج SPSS هذه الإمكانيات من خلال هذا الأمر حيث يظهر مربع حوار يحتوي على العديد من الطرق لتقدير القيم المفقودة منها:
- أ- series mean: يتم تقدير القيم المفقودة بالمتوسط الحسابي لسلسلة البيانات في المتغير.
  - ب- mean of nearby points: يتم تقدير القيم المفقودة بالاعتماد على متوسط القيم المجاورة في أعلى وأسفل القيمة المفقودة وتحدد القيم المجاورة حسب رغبة الباحث.
  - ج- median of nearby points: يعتمد التقدير على الوسيط للقيم المجاورة للقيم المفقودة.
  - د- linear interpolation: اعتماد أسلوب الاستكمال الخطي في تقدير القيم المفقودة.
  - هـ - predicted values: تقدير القيمة المفقودة بالقيمة التنبؤية المستخرجة من انحدار قيم السلسلة المتوفرة (المتغير المعتمد) على (المتغير المستقل) الذي تأخذ قيماً تسلسلية من 1 إلى n.
- في أدناه صورة لأوامر قائمة Transform:



## أمثلة محلولة على بعض أوامر قائمة Transform:-

### 1 - مثال على الأمر Compute:-

- تم إدخال بعض البيانات على أربعة متغيرات هي  $w, e, q, r$  والمطلوب ما يأتي:-
- أ - إيجاد حاصل جمع بيانات المتغير  $w$  والمتغير  $q$  على أن يكون اسم المتغير الجديد  $t$ .
- ب - إيجاد حاصل ضرب بيانات المتغيرات  $e, q, r$  على أن يكون اسم المتغير الجديد  $k$ .
- ت - إيجاد متوسط بيانات المتغيرين  $e, r$  على أن يكون اسم المتغير الجديد  $c$ .

حل المثال:

أ - من قائمة Transform نختار الأمر Compute فيظهر مربع الحوار الخاص بهذا الأمر نقوم بكتابة  $t$  الذي يمثل اسم المتغير الجديد في خانة target variable ثم ننقل المتغير  $w$  من جهة اليسار إلى خانة numeric expression ثم نختار علامة + بعد ذلك ننقل المتغير  $q$  من جهة اليسار إلى خانة numeric expression بجوار علامة + ثم ننقر على مفتاح ok فتظهر النتيجة .

ب - نتبع نفس الخطوات السابقة ولكن نختار  $k$  كاسم للمتغير الجديد ونضع علامة الضرب (\*) بين المتغيرات المطلوب إيجاد حاصل الضرب لهم.

ت - نختار  $c$  كاسم للمتغير الجديد ومن قائمة functions: نختار الدالة  $mean(numexpr,numexpr,...)$  ومن خلاب السهم ننقلها إلى خانة numeric expression وننقل المتغير  $e$  بدل من علامة الاستفهام الأولى والمتغير  $r$  بدل علامة الاستفهام الثانية ثم ننقر مفتاح ok فتظهر النتائج كما في أدناه:

	e	q	r	d	t	k	c	var	var	var
1	11	5	99	8.00	10.00	5445.00	55.00			
2	54	3	23	30.00	9.00	3726.00	38.50			
3	67	8	43	35.00	11.00	23048.00	55.00			
4	23	2	54	15.00	9.00	2484.00	38.50			
5	98	9	67	50.00	11.00	59094.00	82.50			
6	12	6	58	10.00	14.00	4176.00	35.00			
7	34	7	23	21.50	16.00	5474.00	28.50			

**Compute Variable**

Target Variable: c

Numeric Expression: MEAN(e,r)

Functions:

- MAX(value,value,...)
- MBLEN.BYTE(strexpr,pos)
- MEAN(numexpr,numexpr,...)
- MIN(value,value,...)
- MISSING(variable)
- MOD(numexpr,modulus)

## 2 - مثال على الأمر Count:-

المتغيرات d, e, r تحتوي على 7 حالات لكل واحد منها والمطلوب معرفة تكرارات الرقم 2 في كل حالة لجميع المتغيرات.

حل المثال:-

من قائمة Transform نختار الأمر Count فيظهر مربع الحوار الخاص بهذا الأمر فنختار اسم للمتغير الجديد وليكن m ونكتبه في خانة target variable: وننقل المتغيرات d, e, r من جهة اليسار إلى خانة numeric variables: بعد ذلك ننقر مفتاح define values... فيظهر مربع الحوار الخاص به فنكتب في خانة value: الرقم 2 ثم ننقر مفتاح add فينتقل الرقم 2 إلى خانة values to count: بعد ذلك ننقر مفتاح continue فنعود إلى مربع الحوار الأول ونقر مفتاح ok فتظهر النتائج كما في أدناه:

The screenshot shows the SPSS Data Editor interface with two dialog boxes open. The background data table is as follows:

	r	e	d	m
1	2.00	3.00	2.00	2.00
2	3.00	4.00	3.00	.00
3	7.00	7.00	4.00	.00
4	3.00	2.00	3.00	1.00
5	8.00	5.00	8.00	.00
6	2.00	2.00	2.00	3.00
7	6.00	5.00	5.00	.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

The 'Count Occurrences of Values within Cases' dialog box has 'm' as the Target Variable and 'm' as the Target Label. The 'Count Values within Cases: Values to Count' dialog box has 'Value: 2' selected.

### 3- مثال على الأمر replace missing values:-

المتغير product يحتوي على 11 حالة ولكن قيمة الحالة 4 مفقودة والمطلوب تقدير قيمتها بطريقة series mean وهي الطريقة التي يتم فيها حساب القيمة المفقودة بطريقة المتوسط العام للقيم المعلومة.  
حل المثال:

من قائمة transform نختار الأمر replace missing values فيظهر مربع الحوار الخاص بهذا الأمر نقوم بنقل المتغير product من جهة اليسار إلى خانة: new variable(s) ثم من خانة method: نختار الطريقة series mean ثم ننقر على المفتاح ok فتظهر النتيجة كما في أدناه:

The screenshot shows the SPSS Data Editor interface with the 'Replace Missing Values' dialog box open. The background data table is as follows:

	prodecut	prodec_1
1	4.00	4.00
2	3.00	3.00
3	6.00	6.00
4	.	4.80
5	4.00	4.00
6	2.00	2.00
7	8.00	8.00
8	5.00	5.00
9	9.00	9.00
10	4.00	4.00
11	3.00	3.00
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

The 'Replace Missing Values' dialog box has 'prodecut' and 'SMEAN(PRODECUT) [p]' selected in the variable list. The 'New Variable(s):' field contains 'prodec\_1=SMEAN(prodecut)'. The 'Method:' is set to 'Series mean' and the 'Span of nearby points:' is set to 'Number: 2'.

**تمارين على أوامر القائمة Transform :-****تمرين 1:**

المتغير W يحتوي على عد من القيم (يقوم الطالب باختيارها) لا تقل عن 10 ولا تزيد عن 15 على أن يكون واحد منها أو أكثر قيم مفقودة.

المطلوب :

حساب القيم المفقودة بجميع الطرق المتاحة في البرنامج.

**تمرين 2:**

يقوم الطالب بكتابة 20 رقما على أن يكون فيها ثلاثة أرقام مفقودة بعد ذلك يتم تقدير القيم المفقودة بالطرق التالية:

1 - المعدل العام Series mean

2 - معدل ثلاث قيم القريبة Mean of nearby points

3 - الوسيط للقيمتين القريبتين Median of nearby points

**تمرين 3:**

تم إدخال بعض البيانات على ثلاثة متغيرات (يقوم الطالب باختيار أسماء لهذه المتغيرات وعدد القيم لكل متغير).

المطلوب:

أ- قسمة المتغير الأول على المتغير الثالث.

ب- حاصل جمع المتغير الثاني مع المتغير الأول مطروحا منه المتغير الثالث.

ج- إيجاد المتوسط الحسابي للمتغيرات الثلاثة.

ملاحظة: يقوم الطالب باختيار أسماء المتغيرات الجديدة.

**تمرين 4 على الأمر Recode ( recode into different variable ):**

يقوم الطالب بكتابة الأرقام من 20 إلى 50 للمتغير X (variable) بعد ذلك يقوم الطالب بملء الجداول التالية:

جدول رقم 1 متغير التكرارات (output variable = y)

Number of class	Class interval	Frequency
1	20-30	
2	31-40	
3	41-50	
Total		

جدول رقم 2 متغير التكرارات (output variable = z)

Number of class	Class interval	Frequency
1	Lowest 35	
2	Lowest 45	
3	Lowest 50	
Total		

جدول رقم 3 متغير التكرارات (output variable = v)

Number of class	Class interval	Frequency
1	Highest 20	

2	Highest 33	
3	Highest 44	
Total		

**تمرين 5 :**

قام احد الباحثين بدراسة تأثير احد انواع الفيتامينات على زيادة الوزن على 60 خروف وبعد مرور ثلاثة اشهر من التغذية وجد ان اوزانها كانت 30- 51 كغم. المطلوب توزيع هذه الاوزان حسب الجداول التالية:  
جدول 1: (output variable = y)

Number of class	Class interval	Frequency
1	30-33	
2	34-37	
3	38-41	
4	42-45	
5	46-51	
TOTAL		60

جدول 1: (output variable = f)

Number of class	Class interval	Frequency
1	Lowest 33	
2	Lowest 36	
3	Lowest 40	
4	Lowest 44	
5	Lowest 51	
TOTAL		60

جدول 1: (output variable = w)

Number of class	Class interval	Frequency
1	Highest 30	
2	Highest 35	
3	Highest 40	
4	Highest 44	
5	Highest 48	
TOTAL		60

ملاحظة:

- 1- يقوم الطالب بكتابة 60 رقم بين 30 و 51 (اسم المتغير sheep)
- 2- استخدم الطرق التالية لمعرفة عدد تكرارات (Frequency) لكل فئة (Class interval):

- أ - Split file
- ب - Sort cases
- ت - Aggregate

**تمرين 6:**

درجات 30 طالب في احد الامتحانات كانت أعلى درجة 75 و اقل درجة 55 (ملاحظة: يقوم الطالب بكتابة الدرجات ضمن المدى المذكور في أعلاه).

المطلوب: أ- إيجاد طول الفئة class interval علما إن عدد الفئات هي 4  
ب- الخطوات الواجب إتباعها في برنامج SPSS لمعرفة عدد تكرارات كل فئة  
ج- ملئ الجدول التالي:

Number of class	Class interval	Frequency
1		
2		
3		
4		

**تمرين رقم 7:**

إنتاج احد بساتين النخيل خلال 7 سنوات هي كما في الجدول التالي:

year	Product
2004/8/20	320
2005/9/15	430
2006/9/9	390
2007/8/22	440
2008/9/15	440
2009/7/31	400
2010/8/10	410

- المطلوب: 1- الاختلافات (الفروق) السنوية في الإنتاج.  
2 - المجموع التراكمي للإنتاج خلال السنوات المحددة.  
3 - الاختلافات (الفروق) الزمنية بين التواريخ بالتواني.

دليل حل التمارين

- 1- Transform → Replace Missing Values
- 2- Transform → Replace Missing Values
- 3- Transform → Compute Variable
- 4- Transform → Recode → Recode into Different Variables
- 5- Transform → Recode → Recode into Different Variables
- 6- Transform → Recode → Recode into Different Variables
- 7- Transform → Create Time Series



**ملفات المخرجات الإحصائية output files:**

هي الملفات التي تحتوي على نتائج التحليل الإحصائي. عادة يُخلق ملف output عند استخدام أوامر قوائم: Analyze , Graphs , Utilities تتكون واجهة ملف output من الأجزاء التالية:

1- الجزء الخاص بالأشرطة (Bares) ويحتوي على الأشرطة التالية:  
أ- شريط العنوان: يحتوي على اسم الملف الافتراضي وهو output1 وعند تغير الاسم يظهر الاسم الذي تم اختياره

ب- شريط القوائم: ويحتوي على نفس القوائم الموجودة في ملف data editor

ج- شريط الأدوات: ويحتوي على معظم الأدوات الموجودة في ملف data editor

د- شريط التنسيق: يحتوي هذا الشريط على أيقونات تستخدم في فتح أو غلق أو إضافة عنوان أو شرح للنتائج.

2- الجزء الخاص بالمعلومات information area:

هي المساحة المخصصة لعرض ملخص محتويات النتائج حيث يمكن من خلالها عرض بعض أو كل النتائج التي تم التوصل إليها، وتكون عادة في الجهة اليسرى من واجهة الملف.

3- الجزء الخاص بعرض النتائج processing area: هو الجزء الأكبر من واجهة ملف output حيث تظهر فيه جميع نتائج التحليل الإحصائي المطلوب. تظهر واجهة ملف output كما في الصورة التالية:

Statistics		VAR00001	VAR00002
N	Valid	3	3
	Missing	0	0

**رابعاً:- أوامر قائمة Analyze:**

بعد أن تم إدخال البيانات إلى برنامج SPSS وترتيبها وإجراء العمليات الحسابية المطلوبة عليها نقوم بالتحليل الإحصائي لهذه البيانات من خلال أوامر القائمة analyze التي نذكر بعضاً منها:

1:- الأمر الرئيسي **descriptive statistics**: الذي يحتوي على الأوامر الفرعية التالية:

أ- الأمر **Frequencies**:- يستعمل هذا الأمر لعرض تكرار كل قيمة لمتغير ما وحساب بعض مقاييس التمرکز والتشتت والرُبيعات والمُئينات مع عرض بعض المخططات البيانية. ويمكن الوصول إلى هذا الأمر كالتالي:

Analyze → descriptive statistics → frequencies

ب- الأمر descriptive: يستخدم هذا الأمر لإيجاد الوسط الحسابي mean والانحراف المعياري std. Deviation والتباين variance وغيرها من مقاييس الإحصاء الوصفي لمتغير واحد أو لمجموعة متغيرات.  
ويمكن الوصول إلى هذا الأمر كالاتي:

Analyze → descriptive statistics → descriptive

### أمثلة محلولة:

#### 1- مثال على الأمر Frequencies:

المتغير weight يمثل وزن 80 عجل بالكيلوغرامات تتراوح أوزانها ما بين 75 إلى 120 كغم (ملاحظة: يقوم الطالب بكتابة الأوزان).

المطلوب إيجاد البيانات الإحصائية التالية:

- أ- تكرارات الأوزان
- ب- مقاييس النزعة المركزية
- ج- مقاييس التشتت
- د- الربيعات
- هـ- ترتيب البيانات تصاعديا


#### حل المثال

بعد أن يقوم الطالب بكتابة 80 قيمة تمثل أوزان العجول في متغير باسم weight في ورقة data view من شريط القوائم نختار


Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

فيظهر مربع حوار Frequencies فننقل اسم المتغير weight من جهة اليمين إلى جهة اليسار في خانة Variable(s):


تأشير مربع Display frequency tables لإظهار التكرارات فيظهر مربع الحوار كما في الصورة التالية:



حيث يمكن نقل المتغيرات المطلوبة من جهة اليسار إلى جهة اليمين وعند النقر على مفتاح statistics... يظهر مربع الحوار الخاص به وهو كما يأتي:



وفيه يتم تأشير الإعازات الإحصائية المطلوبة ثم ننقر مفتاح continue فنعود إلى مربع الحوار الرئيسي (frequencies) ومنه ننقر المفتاح charts... فيظهر مربع الحوار الخاص بت وهو كما يأتي:



يستخدم هذا المربع لتحديد أنواع المخططات البيانية المطلوبة بعد ذلك ننقر مفتاح continue فنعود إلى مربع الحوار الرئيسي ومنه ننقر مفتاح format فيظهر لنا مربع حوار لنختار منه نوع الترتيب لتكرارات القيم (تصاعدي أو تنازلي) وكذلك يعرض نوع العرض الخاص بالجدول لنتائج الوصف حيث من خلال الموقع order by: نختار ترتيب المشاهدات في الجدول التكراري تصاعدياً أو تنازلياً حسب القيمة values أو حسب التكرارات counts أما الموقع multiple variables: فمخصص في حالة اختيار أكثر من متغير للوصف يتم اختيار compare variables لعرض المؤشرات الإحصائية للمتغيرات كافة في جدول واحد إما إذا تم اختيار organize output by variables فيعرض مؤشرات كل متغير في جدول مستقل. وعند النقر على مفتاح continue نعود إلى مربع الحوار الرئيسي منه ننقر المفتاح ok فتظهر النتائج في ملف output كما في الصورة أدناه.

**Statistics**

WEIGHT		
Valid	Missing	
N		80
Mean		96.76
Std. Error of Mean		1.719
Median		93.00
Mode		91
Std. Deviation		15.372
Variance		236.310
Range		50
Minimum		75
Maximum		125
Sum		7741
Percentiles	25	84.00
	50	93.00
	75	111.75

**WEIGHT**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 75	4	5.0	5.0	5.0
77	1	1.3	1.3	6.3
78	3	3.8	3.8	10.0
79	2	2.5	2.5	12.5
81	2	2.5	2.5	15.0
82	4	5.0	5.0	20.0
83	3	3.8	3.8	23.8

## 2- مثال على الأمر Descriptives :

الجدول التالي يتضمن المتغيرات  $x_1, x_2, x_3$  والتي تم إدخالها في data editor لبرنامج SPSS والمطلوب:

أ- إضافة المتغيرات المعيارية للقيم في صفحة data variables

ب- حساب المتوسط

ج- حساب مقاييس التشتت

X1	X2	X3
85	55	61
75	50	70
69	65	66
62	52	62
60	60	75
57		64
51		73
50		80
90		
70		
56		
65		
83		

حل المثال:

من شريط القوائم نختار

Analyze → Descriptive statistics → Descriptives


فيظهر مربع حوار Descriptives

ننقل المتغيرات الثلاثة  $x_1, x_2, x_3$  من جهة اليمين إلى جهة اليسار


لإضافة المتغيرات المعيارية نؤشر المربع المجاور لعبارة :

## Save standardized values as variables

فيظهر مربع الحوار كما في الصورة التالية:



يتم نقل المتغيرات من جهة اليمين إلى جهة اليسار ولأجل اختيار المؤشرات الإحصائية الوصفية ننقر مفتاح options... فيظهر مربع الحوار الخاص به كما يلي:



فتأشير المقاييس الإحصائية الوصفية المطلوبة علما إن موقع display order يمكن من خلاله اختيار نوع ترتيب عرض النتائج بتأشير أحد الخيارات التالية:

أ- variable list: يعرض المقاييس الوصفية حسب تسلسل المتغيرات الواردة في موقع variables في مربع الحوار descriptive.

ب- alphabetic: يعرض المقاييس الوصفية حسب الترتيب الهجائي للمتغيرات

ج- ascending means: يعرض المقاييس الوصفية حسب الترتيب التصاعدي للأوساط الحسابية للمتغيرات


د- descending means: يعرض المقاييس الوصفية حسب الترتيب التنازلي للأوساط الحسابية للمتغيرات بعد ذلك ننقر مفتاح continue فنعود إلى مربع الحوار الرئيسي وننقر مفتاح ok فتظهر نتائج التحليل الإحصائي في ملف output.

**2 :- الأمر الرئيسي Compare Means الذي يحتوي على الأوامر الفرعية التالية:****أ- الأمر One Sample T-Test:**

هناك حالات نحتاج لاختبار فرق متوسط مجموعة من البيانات عن قيمة معينة ثابتة حيث يفيد هذا الأمر في اكتشاف وجود اختلاف معنوي significant difference لمتوسط المجتمع الذي سحبت منه العينة عن قيمة ثابتة constant . إضافة إلى إمكانية تقدير فترة الثقة confidence interval لمتوسط المجتمع ويستعمل هذا الاختيار للعينات الصغيرة والتي يكون حجمها اقل من 30 مشاهدة. يمكن الوصول إلى هذا الأمر كما يأتي:

Analyze → Compare Means → one sample T-Test

فيظهر مربع الحوار التالي:




ننقل المتغير من جهة اليسار الجهة اليمين في خانة Test variable(s) ثم نكتب القيمة المطلوب اختبار متوسط المجتمع على ضوءها في خانة Test Value: ثم من مفتاح options... نحدد مستوى المعنوية ثم نقر مفتاح ok لتظهر نتائج التحليل الإحصائي في ملف output

**ب- الأمر Independent samples T-Test:**


يستعمل هذا الأمر للمقارنة بين متوسطي مجموعتين من الحالات عن طريق إجراء اختبار T-Test الإحصائي للكشف عن وجود فروق معنوية بين متوسطات المتغيرات من عدمه للمتغيرات المستقلة مثلا دراسة نسبة البروتين لصنفين مختلفين من الحنطة . ويمكن الوصول إلى هذا الأمر كالتالي:

Analyze → Compare Means → Independent Samples T-test


فيظهر صندوق الحوار التالي:



نقوم بنقل المتغير أو المتغيرات المراد دراستها إلى جهة اليمين في خانة: test variable(s) أما متغير التجزئة (التعريفية) فينقل إلى خانة: grouping variable: بعد نقر مفتاح define groups فيظهر مربع الحوار التالي:



في مربع الحوار هذا توضع رموز أو أرقام مجموعتي التجزئة (التعريفية) في الخانتين الخاصتين بهما، توجد طريقة أخرى في تحديد المجاميع من خلال تحديد نقطة فصل cut point في مربع الحوار هذا فكل قيمة قبلها تكون المجموعة الأولى وما بعدها تكون المجموعة الثانية وفي هذه الحالة يجب أن تكون المتغيرات من النوع العددي، من خلال النتائج التي نحصل عليها نلاحظ إن الاختبار يعرض بحالتين الأولى في حالة فرض تساوي تباين المجتمعين لكلا المجموعتين المأخوذة منهم العينة equal variances assumed والحالة الثانية يعرض تحت فرض عدم تساوي تباين المجموعتين لكلا المجموعتين المأخوذة منهم العينات equal variances not assumed، بعدها نقر مفتاح continue لنعود إلى مربع الحوار الأول منه نقر مفتاح option فيظهر مربع الحوار التالي:



في مربع الحوار هذا نختار مستوى المعنوية المطلوبة ونكتبه في خانة confidence interval وفي موقع missing values فإن الاختيار الأول يتم فيه استبعاد القيم المفقودة لأحد المجاميع دون الآخر أما الاختيار الثاني يتم فيه استبعاد القيمة المفقودة ونظيرتها من القيم في المتغيرات أخرى وبذلك تضمن الحالات الصحيحة فقط لكل المتغيرات، بعد ذلك نقر مفتاح continue لنعود إلى مربع الحوار الأول منه نقر مفتاح ok لتظهر نتائج التحليل الإحصائي في ملف output


### ج- الأمر paired-samples T-Test:

يستعمل هذا الأمر لاكتشاف معنوية الفرق بين متوسطي متغيرين لعينة ما مكونة من أزواج من المشاهدات لها علاقة مع بعضها مثلا اختبار معنوية الفرق بين متوسط نسبة الكوليسترول في الدم قبل تناول الدواء وبعده في عينة مكونة من عدد من الأشخاص أو اختبار معنوية الفرق بين نسبة الدهون في حليب مجموعة من الأبقار قبل

تناول عقار معين وبعده وهذا يعني إن هناك علاقة بين مشاهدات العينات للمتغير أو المتغيرات قيد الدراسة ولهذا يتم وضع مشاهدات كل مجموعة في متغير أو عمود منفصل في نافذة محرر البيانات. ولتنفيذ هذا الأمر نتبع الخطوات التالية:

\* نرتب البيانات في نافذة data editor على شكل أزواج من البيانات للمتغيرين المطلوب اختبارهما  
\* من شريط القوائم نختار:

Analyze → compare means → paired samples T-Test  
فيظهر مربع الحوار التالي:



نقوم بنقل المتغيرين المراد اختبارهما من جهة اليسار إلى جهة اليمين (خانة: paired variables: ومن ثم ننقر مفتاح options ونحدد مستوى المعنوية كما في الإيعاز السابق ثم ننقر مفتاح ok في مربع الحوار الأساسي فتظهر النتائج في ملف output

#### د - تحليل التباين Analyses of Variance:

يعتبر تحليل التباين واحد من أهم التحليلات الإحصائية وأكثرها شيوعاً واستخداماً ويستخدم لإيجاد فيما إذا كان هناك فروق معنوية بين المتوسطات ضمن متغير واحد لعدد من المجاميع أو ضمن عدة متغيرات، ويعرف تحليل التباين تحليل العمليات الرياضية الخاصة بتقسيم مجموع المربعات الكلي لمجموعة من البيانات إلى مصادر مختلفة وتلخص نتائج التحليل في جدول يسمى جدول تحليل التباين ويعرف اختصاراً ANOVA Table وبهذا يهدف التحليل إجراء اختبار فرضية تساوي متوسطات مجموعة من العينات وتعرف بالمعاملات أو المعاملات (treatments) دفعة واحدة ولهذا فهو يعتبر توسيعاً لاختبار T-Test والذي يستخدم لاختبار فرضية تساوي متوسط عينتين فقط وسوف نتطرق إلى نوعين رئيسيين من اختبارات تحليل التباين يوفرها برنامج SPSS وتستخدم حسب نوعية مشاهدات العينة للمتغيرات قيد الدراسة وهي:


#### ✓ - تحليل التباين لمعيار واحد والمتمثل بالأمر one way ANOVA:

هو نفس التحليل الاختبار T-Test في العينات المستقلة، حيث إن الاختلاف عن الاختبار المذكور هو عندما يكون في المتغير المستقل (متغير المجاميع) أكثر من مجموعتين حيث إن اختبار T-Test مخصص فقط لتحليل مجموعتين وهنا في تحليل التباين يتغير اسم المتغير المستقل من (Grouping variables) إلى Factor في نافذة أمر تحليل التباين لمعيار واحد. ويمكن الوصول إلى هذا الأمر كما يأتي:


Analyze → Compare Means → One way ANOVA

فيظهر مربع الحوار التالي:






في مربع الحوار السابق نقوم بنقل المتغير التابع إلى جهة اليمين في خانة dependent list أما المتغير المستقل فينقل إلى خانة factor وعند النقر على مفتاح option يظهر مربع الحوار التالي فنؤشر المربع الخاص باختبار التجانس homogeneity of variance test



بعد ذلك نعود إلى مربع الحوار الرئيسي وننقر مفتاح post hoc فيظهر مربع الحوار التالي الذي فيه عدة اختيارات لاختبارات المقارنات المتعددة يمكن لنا اختيار أي من هذه الاختبارات الإحصائية حيث يمكن أن نؤشر الخانة الخاصة بتحليل LSD ومن ثم نعود لمربع الأحوال الأول وننقر مفتاح OK فنظهر النتائج في ملف

OUTPUT



**أمثلة محلولة على الأمر الرئيسي : Compare Means****✓ -مثال على الأمر الفرعي One Sample T-Test :**

المتغير weight يمثل عينة لأوزان 10 من الدجاج بعمر 52 يوم والأوزان هي بـ(كغم) :

1.10, 0.8, 1.20, 1.00, 0.9, 1.20, 1.10, 0.9, 0.8, 1.2

المطلوب : اختبار فيما إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للمجتمع الذي سحبت منه العينة يساوي 1.25 كغم أم لا، بمستوى دلالة (فترة ثقة confidence interval) 5% و 1% أي هل نقبل فرضية العدم القائلة: إن متوسط الحسابي للمجتمع الذي سحبت منه العينة يساوي 1.25 أم نقبل بالفرضية البديلة القائلة: بعدم التساوي؟

$H_0: \mu_x = 1.25$

فرضية العدم

$H_1: \mu_x \neq 1.25$


الفرضية البديلة

ملاحظة: تقدير فترة الثقة ( confidence interval ) للوسط الحسابي للمجتمع 99% و 95%  
حل المثال:


\* نقوم بإدخال البيانات المتغير weight في صفحة data editor  
\* من شريط القوائم نختار:

Analyze → compare means → one sample T Test

\* يظهر مربع الحوار الخاص بهذا الأمر:



فيتم نقل المتغير weight من جهة اليسار إلى جهة اليمين في خانة Test variable(s) ونكتب في خانة test value: القيمة 1.25 ثم ننقر مفتاح options ونكتب في خانة confidence interval (فترة الثقة) الرقم 99 ثم نعود لمربع الحوار الرئيسي وننقر مفتاح ok فتظهر النتائج كما يلي:



تحليل النتائج: بما إن  $0.002 = \text{sig. (2-tailed)}$  وهي اقل من  $0.05$  وكذلك اقل من  $0.01$  لذا نرفض فرضية العدم والقبول بالفرضية البديلة القائلة بعدم تساوي المتوسط الحسابي للمجتمع الذي سحبت منه العينة مع القيمة الثابتة وهي  $1.25$  كيلوغرام.

### ✓ مثال على الأمر independent samples T-Test:

في تجربة لمقارنة نسبة البروتين في صنفين من الحنطة A و B تم اختيار 12 نباتا من كل صنف وقدرة نسبة البروتين فيها وكانت النتائج كما في الجدول الآتي:

صنف الحنطة B	صنف الحنطة A
9.4	12.5
8.4	9.4
11.6	11.7
7.2	11.3
9.7	9.9
7.0	8.7
10.4	9.6
8.2	11.5
6.9	10.3
12.7	10.9
7.3	9.6
9.2	9.7

المطلوب اختبار وجود فرق معنوي بين متوسطي نسبة البروتين في الصنفين لمستوى دلالة 5%، أي هل يتم قبول فرضية العدم أم قبول الفرضية البديلة؟

$$H_0: \mu_A = \mu_B$$

$$H_1: \mu_A \neq \mu_B$$

فرضية العدم  
الفرضية البديلة

حل المثال:


نقوم بإدخال البيانات في data editor كما يظهر في الجدول التالي، حيث المتغير protein يمثل نسبة البروتين والمتغير group هو متغير التجزئة (التعريفية)

protein	group
12.5	A
9.4	A
11.7	A
11.3	A
9.9	A
8.7	A
9.6	A
11.5	A
10.3	A
10.9	A
9.6	A
9.7	A
9.4	B
8.4	B
11.6	B
7.2	B
9.7	B
7.0	B
10.4	B
8.2	B
6.9	B
12.7	B
7.3	B
9.2	B

من شريط القوائم نختار

Analyze → compare means → independent samples T-Test

فتظهر مربعات الحوار التالية الذي نرتبها كما في الصورة أدناه:



وعند النقر على مفتاح ok في مربع الحوار الرئيسي تظهر النتائج في ملف output كما في الصورة التالية:

#### → T-Test

Group Statistics					
	GROUP	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PROTEIN	A	12	10.4000	1.13137	.32660
	B	12	9.0000	1.87423	.54104

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means					95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
PROTEIN	Equal variances assumed	2.776	.110	2.215	22	.037	1.4000	.63198	.08936	2.71064
	Equal variances not assumed			2.215	18.077	.040	1.4000	.63198	.07267	2.72733

تفسير النتائج: بما إن  $\text{sig. (2-tailed)} = 0.037$  وهي اقل من  $0.05$  لذا نرفض فرضية العدم والقبول بالفرضية البديلة القائلة بعدم تساوي المتوسط الحسابي لصنفي الحنطة A, B.

تمرين على الأمر one sample T- test

تدعي إحدى شركات الصناعات الغذائية بأنها تنتج علب لمعجون الطماطا بسعة 1 كغم كمتوسط للعلبة الواحدة ومن اجل التأكد من هذا الادعاء تم اخذ عينة من إنتاجها تبلغ 20 علبة وكانت أوزانها كما التالي، والمطلوب:

- 1 - هل الشركة صادقة في ادعائها.
- 2 - وإذا كانت غير ذلك فهل متوسط إنتاجها أكبر أم اقل من 1 كغم تحت مستوى معنوية  $0.05$  ، وكيف تستدل على ذلك؟

علما أن فرضية العدم والفرضية البديلة هي كما يأتي:

$$H_0: \mu_x = 1 \text{ كغم}$$

$$H_1: \mu_x \neq 1 \text{ كغم}$$

ت	حجم العلبه كغم
1	1.12
2	0.90
3	0.80
4	0.90
5	0.98
6	0.95
7	0.97
8	0.90
9	1.05
10	1.00
11	0.91
12	0.93
13	0.94
14	1.00
15	0.93
16	1.05
17	0.90
18	0.89
19	1.00
20	1.05

### تمرين على الأمر **independent samples T-Test**:

في تجربة لمقارنة نسبة الدهن في حليب سلالتين من الأبقار Z و Q تم اختيار 16 عينة من كل سلالة وقدرة نسبة الدهن فيها وكانت النتائج كما في الجدول الآتي :

سلالة Q	سلالة Z
3.1	3.4
2.6	2.8
2.9	3.1
3.4	3.6
3.1	2.5
2.8	3.4
2.9	2.9

3.5	3.0
3.1	3.2
2.8	3.7
2.9	2.9
3.0	2.7
2.9	3.1
2.5	3.5
2.6	3.2
2.5	3.3

المطلوب اختبار وجود فرق معنوي بين متوسطي نسبة البروتين في الصنفين لمستوى دلالة 5%، أي هل يتم قبول فرضية العدم أم قبول الفرضية البديلة؟

$$H_0: \mu_Q = \mu_Z$$

$$H_1: \mu_Q \neq \mu_Z$$

فرضية العدم

الفرضية البديلة

تمرين على الأمر independent sample t- test

في تجربة لمقارنة نسبة النشاء في صنفين من البطاطا حيث تم اختيار 15 كغم من الصنف A و 10 كغم من الصنف B ثم تم تقدير معدل نسبة النشاء في كل كغم وكانت النتائج كما في الجدول التالي:

صنف البطاطا A	صنف البطاطا B
30.1	32.3
29.2	33.2
32.1	28.1
27.4	27.3
30.2	26.2
31.4	25.1
26.8	24.3
32.5	24.5
28.6	26.5
27.5	27.1
29.3	
36.2	
28.4	
31.3	
33.5	

المطلوب اختبار وجود فروق معنوية بين متوسطي نسبة النشاء في الصنفين في مستوى معنوية 5% أي هل يتم قبول فرضية العدم أم لا، وفي حالة وجود فرق معنوي بين الصنفين فأيهما أفضل من الآخر؟

$$H_0: \mu_A = \mu_B$$

$$H_1: \mu_A \neq \mu_B$$

فرضية العدم

الفرضية البديلة

**مثال على الأمر: paired-samples T-Test**

تم زراعة أحد أصناف الذرة الصفراء في عشر مناطق واستخدمت قطعتان متساويتان في كل منطقة ، تم تسميد إحدى القطع بكمية معينة من السماد الكيماوي بينما تركت الأخرى بدون تسميد والبيانات التالية تمثل كمية المحصول في كل قطعة:

المنطقة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
قطعة a	107	175	142	150	123	185	148	155	177	116
قطعة b	135	200	160	182	147	200	172	186	194	141

المطلوب اختبار الفرضية القائلة بتساوي متوسطي كمية الإنتاج للمحصول في كلا الحالتين بمستوى دلالة 5%، أي هل يتم قبول فرضية العدم أم قبول الفرضية البديلة؟

$$H_0: \mu A = \mu B$$

$$H_1: \mu A \neq \mu B$$

فرضية العدم


الفرضية البديلة

حل المثال

\* نقوم بإدخال البيانات في محرر البيانات (data editor) كما في الصورة التالية  
\* من شريط القوائم نختار:

Analyze → compare means → paired samples T-Test

فيظهر مربع الحوار الذي نقوم بترتيبه على الشكل التالي:



\* نقر مفتاح options لنحدد مستوى المعنوية أي نكتب 95  
\* نعود لمربع الحوار الأول ونقر مفتاح ok فتظهر النتائج كما يأتي:



## T-Test

## Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 قطعة A	148.00	10	26.319	8.323
قطعة B	171.70	10	24.599	7.779

## Paired Samples Correlations

Pair 1	N	Correlation	Sig.
قطعة A & قطعة B	10	.977	.000

## Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 قطعة B - قطعة A	-23.70	5.736	1.814	-27.80	-19.60	-13.066	9	.000

تفسير النتائج: بما إن  $0.000 = \text{sig. (2-tailed)}$  وهي اقل من  $0.05$  لذا نرفض فرضية العدم والقبول بالفرضية البديلة القائلة بعدم تساوي المتوسط الحسابي للإنتاج لصنفي الذرة الصفراء A, B.

## تمرين على الأمر paired sample t-test

في إحدى التجارب لدراسة تأثير السماد العضوي على زيادة إنتاج محصول الطماطة تم زراعة 22 قطعة متساوية بالمحصول حيث أضيف إلى نصفها كميات متساوية من السماد العضوي (a1) وتركت الأخرى دون إضافة سماد (a0) وكانت النتائج كالتالي:

a0	114	100	113	102	112	105	111	107	110	108	107
a1	136	125	135	127	134	127	133	128	132	130	128

المطلوب اختبار الفرضية القائلة هناك فرق معنوي في متوسطي الإنتاج. أي رفض فرضية العدم والقبول بالفرضية البديلة.

$$H_0: \mu a_0 = \mu a_1$$

$$H_1: \mu a_0 \neq \mu a_1$$

فرضية العدم  
الفرضية البديلة

## مثال على تحليل التباين لمعيار واحد والمتمثل بالأمر one way ANOVA:

استخدمت أربع طرق صناعية لإنتاج نوع معين من القماش وبثلاثة مكررات لكل طريقة وكانت نتيجة التجربة لكميات الإنتاج كما في الجدول التالي:

الطريقة/ المكررات	1	2	3	المتوسط
الطريقة 1	55	47	48	50
الطريقة 2	55	64	64	61
الطريقة 3	55	49	52	52
الطريقة 4	50	44	41	45

المطلوب:

- 1- إجراء تحليل التباين واختبار معنوية الفروق بين المتوسطات الطرق الصناعية وبمستوى دلالة 0.05.
- 2- في حالة ظهور معنوية في الفروق بين الطرق الصناعية باستخدام اختبار F، اختبر معنوية الفروق بين متوسطي كل طريقتين باستخدام طريقة الفرق المعنوي الأصغر LSD ولمستوى دلالة 0.05.

حل المثال:

يتم إدخال البيانات إلى نافذة محرر البيانات وكما يلي وبمتغيرين الأول للطريقة (method) والثاني لكميات الإنتاج (product):

method	product
1	55
1	47
1	48
2	55
2	64
2	64
3	55
3	49
3	52
4	50
4	44
4	41

ومن شريط القوائم نختار الأمر التالي:

Analyze → compare means → one way ANOVA

فيظهر مربع الحوار التالي والذي نقوم بترتيب متغيراته كما يأتي:

The image shows two overlapping dialog boxes from SPSS. The top dialog is 'One-Way ANOVA' with 'product' in the 'Dependent List' and 'method' in the 'Factor' field. The bottom dialog is 'One-Way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparisons' with 'LSD' checked under 'Equal Variances Assumed' and 'Significance level' set to .05. The background shows the SPSS Data Editor with the data table from the previous block.

بعد ذلك ننقر مفتاح ok فتظهر النتائج كما يأتي:

ANOVA					
PRODUCT					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	402.000	3	134.000	7.053	.012
Within Groups	152.000	8	19.000		
Total	554.000	11			

## Post Hoc Tests

### Multiple Comparisons

Dependent Variable: PRODUCT

LSD

(I) METHOD	(J) METHOD	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	-11.00*	3.559	.015	-19.21	-2.79
	3	-2.00	3.559	.590	-10.21	6.21
	4	5.00	3.559	.198	-3.21	13.21
2	1	11.00*	3.559	.015	2.79	19.21
	3	9.00*	3.559	.035	.79	17.21
	4	16.00*	3.559	.002	7.79	24.21
3	1	2.00	3.559	.590	-6.21	10.21
	2	-9.00*	3.559	.035	-17.21	-7.79
	4	7.00	3.559	.085	-1.21	15.21
4	1	-5.00	3.559	.198	-13.21	3.21
	2	-16.00*	3.559	.002	-24.21	-7.79
	3	-7.00	3.559	.085	-15.21	1.21

\*. The mean difference is significant at the .05 level.

تفسير النتائج: بما إن قيمة  $0.012 = sig.$  في جدول (ANOVA) هي اقل من  $0.05$  مما يدل على وجود فروقات معنوية بمستوى دلالة  $0.05$  لمتوسطات الإنتاج للطرق الصناعية الأربعة وهذا يعني عدم تساوي متوسطي طريقتين على الأقل، ولاختبار معنوية الفروق لكل طريقة بالمقارنة بالطرق الأخرى نلجأ إلى المقارنات المتعددة **multiple comparisons** باستخدام طريقة LSD من خلال تأشير اسم الطريقة في مربع حوار الخاص بـ **post hoc** مع مستوى دلالة  $0.05$  في موقع **significance level** لتظهر نتائج المقارنات المتعددة كما في الصورة أعلاه علماً إن وجود علامة \* بجوار الرقم يدل على وجود فرق معنوي بين تلك الطريقتين وإن وجود الإشارة السالبة يعني إن الفرق المعنوي لصالح (J)METHOD والعكس صحيح وعلى هذا الأساس فإن الطريقة الثانية قد تفوقت على بقية الطرق لأن لها فروقات معنوية موجبة مع بقية الطرق.

## تمرين 1 على الأمر one way ANOVA:

في تجربة لدراسة تأثير إضافة كميات مختلفة من سماد البوتاسيوم في زيادة إنتاج محصول القطن، تم إجراء أربع معاملات لهذا الغرض وبخمس مكررات لكل معاملة وكانت نتائج التجربة كما يأتي:

المعاملات	المكررات	مكرر 1	مكرر 2	مكرر 3	مكرر 4	مكرر 5	المتوسط
المعاملة 1: صفر سماد		64	67	60	65	61	63.4
المعاملة 2: 10 كغم سماد / دونم		75	80	81	79	78	78.6
المعاملة 3: 20 كغم سماد / دونم		90	95	89	98	100	94.4
المعاملة 4: 30 كغم سماد / دونم		91	96	92	97	101	95.4

المطلوب:

1- إجراء تحليل التباين واختبار معنوية الفروق بين المعاملات باستخدام اختبار F وبمستوى دلالة  $0.05$

- 2- في حالة ظهور فروق معنوية بين المعاملات باستخدام اختبار F، اختبر معنوية الفروق بين متوسط إنتاج كل معاملة مع بقية المعاملات باستخدام طريقة الفرق المعنوي الأصغر LSD وبمستوى دلالة 0.05.
- 3- بأي معاملة من المعاملات السابقة تنصح المزارع باستخدامها ولماذا؟

### تمرين 2 على الأمر one way ANOVA:

في تجربة لدراسة تأثير إضافة كميات من سماد النيتروجين في معدل زيادة عدد ووزن الثمرة من محصول الطماطا، تم إجراء أربع معاملات لهذا الغرض وبخمس مكررات لكل معاملة وكانت نتائج التجربة كما يأتي:

المعاملة / المكرر	مكرر 1	مكرر 2	مكرر 3	مكرر 4	مكرر 5	المتوسط
المعاملة 1 صفر سماد	وزن	61	64	57	62	58
	عدد	20	21	23	21	24
المعاملة 2 10 كغم سماد / دونم	وزن	72	77	78	76	75
	عدد	25	23	21	22	23
المعاملة 3 20 كغم سماد / دونم	وزن	87	92	86	95	97
	عدد	21	24	20	23	22
المعاملة 4 30 كغم سماد / دونم	وزن	88	93	89	94	98
	عدد	30	32	31	34	33

المطلوب:

- 4- إجراء تحليل التباين واختبار معنوية الفروق بين المعاملات باستخدام اختبار F وبمستوى دلالة 0.05
- 5- في حالة ظهور فروق معنوية بين المعاملات باستخدام اختبار F، اختبر معنوية الفروق بين متوسط وزن الثمرة كل معاملة مع بقية المعاملات وكذلك متوسط عدد الثمار باستخدام طريقة الفرق المعنوي الأصغر LSD وبمستوى دلالة 0.05.
- 6- بأي معاملة من المعاملات السابقة تنصح المزارع باستخدامها في حالة:  
أ - رغبته بمتوسط ثمار أكبر ولماذا؟  
ب - رغبته بعدد أكبر من الثمار ولماذا؟

### 3- الأمر الرئيسي General Linear Model: الذي يحتوي على الأمر الفرعي التالي:

#### - الأمر univariate (تحليل التباين لمعيارين Two Way ANOVA):

تحليل التباين لمتغيرين (عاملين) هو عندما يكون هناك متغير تابع (معتمد) واحد ومتغيرين مستقلين يؤثران على المتغير التابع ومن الممكن أن يكون تأثير المتغيرين المستقلين ثابت التأثير Fixed أو أن يكون عشوائي التأثير Random أو أن يكون مزدوج التأثير Mixed ويستفاد من تحليل التباين لمعيارين في اختبار معنوية تساوي متوسطات معالجات المتغير المستقل الأول (العامل الأول) إضافة إلى اختبار معنوية تساوي متوسطات معالجات المتغير المستقل الثاني (العامل الثاني) ويمكن الوصول إلى هذا الأمر كما يأتي:

Analyze → General Linear Model → univariate

#### \* مثال على الأمر univariate :

تم زراعة مجموعة من قطع الأراضي الزراعية المتساوية الخصوبة والمساحة بثلاثة أنواع مختلفة من بذور القمح وكذلك تم تسميدها بثلاثة أنواع مختلفة من الأسمدة وقد تم تسجيل الكميات المنتجة كما مدون في الجدول التالي والمطلوب معرفة هل هناك فروق معنوية بين متوسطات كميات الإنتاج بالنسبة للبذور وأي نوع هو الأفضل من هذه البذور وكذلك هل توجد فروق معنوية بين كميات الإنتاج بالنسبة إلى أنواع الأسمدة المختلفة وأي نوع من الأسمدة هو الأفضل مع اعتماد مستوى دلالة 0.05 .

s	3	1	3	3	1	1	1	2	3	1	2	3	1	2	2	1	1	2	3	2	3	2	3	1	2	2	3	3	2	1
c	3	1	2	1	1	2	3	3	2	1	2	3	1	3	2	1	2	3	3	2	1	2	1	2	1	1	2	3	3	3
p	9	2	5	3	6	2	7	9	4	3	6	7	5	9	3	4	3	8	7	4	7	3	8	4	3	4	6	9	7	6

حيث: S تمثل نوع البذور (متغير مستقل)، C نوع السماد (متغير مستقل)، P كمية الإنتاج (متغير تابع).  
حل المثال:

نقوم بإدخال البيانات في data view ومن شريط القوائم نختار:

Analyze → general linear model → univariate

فيظهر مربع الحوار الخاص بهذا الأمر والذي نقوم بترتيب متغيراته التابعة والمستقلة وكما يأتي:

The screenshot shows the SPSS Univariate dialog box. The 'Dependent Variable' is set to 'p'. The 'Fixed Factor(s)' are 's' and 'c'. The 'Random Factor(s)' field is empty. The 'Covariate(s)' field is empty. The 'WLS Weight' field is empty. The 'Model...', 'Contrasts...', 'Plots...', 'Post Hoc...', 'Save...', and 'Options...' buttons are visible on the right side of the dialog box. The background shows the SPSS Data Editor window with the data table from the previous image.

ثم نختار المفتاح post hoc من مربع الحوار السابق لتحديد أي من البذور أفضل وكذلك أي من الأسمدة أفضل ونقوم باختيار اختبار scheffe لإجراء المقارنات المتعددة:

The screenshot shows the 'Univariate: Post Hoc Multiple Comparisons for Observed Means' dialog box. The 'Factor(s)' field contains 's'. The 'Post Hoc Tests for:' field contains 's'. Under 'Equal Variances Assumed', the 'Scheffe' checkbox is checked. Other options include LSD, Bonferroni, Sidak, R-E-G-W F, R-E-G-W Q, S-N-K, Tukey, Tukey's-b, Duncan, Hochberg's GT2, Gabriel, Waller-Duncan, and Dunnett. The 'Type I/Type II Error Ratio' is set to 100. The 'Control Category' is set to 'Last'. The 'Test' is set to '2-sided'. Under 'Equal Variances Not Assumed', the 'Tamhane's T2', 'Dunnett's T3', 'Games-Howell', and 'Dunnett's C' checkboxes are visible.

## Univariate Analysis of Variance

### Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: P

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	116.483 <sup>a</sup>	8	14.560	9.901	.000
Intercept	815.560	1	815.560	554.563	.000
S	29.422	2	14.711	10.003	.001
C	68.826	2	34.413	23.400	.000
S * C	.227	4	5.684E-02	.039	.997
Error	30.883	21	1.471		
Total	1033.000	30			
Corrected Total	147.367	29			

a. R Squared = .790 (Adjusted R Squared = .711)

من خلال جدول النتائج أعلاه يتضح هناك تأثير معنوي للفروقات للمتغير الأول S (نوع البذور) حيث إن  $sig. = 0.001$  وهو اصغر من  $0.05$  أي هناك فروق معنوية كبيرة بين متوسطات الإنتاج لأنواع البذور وهذا يعني إن هناك تفضيل لنوع من البذور على الأخرى بالنسبة إلى الإنتاج. كذلك هو الحال بالنسبة إلى المتغير الثاني C (نوع السماد) حيث إن  $sig. = 0.000$  أي إن هناك فروقات كبيرة بين متوسطات الإنتاج المتعلقة بنوع السماد أي هناك تفضيل نوع عن الأخرى. كذلك يلاحظ انه ليس هناك تفاعل بين المتغيرات المستقلة لأن قيمة  $sig.$  الخاصة بتفاعل المتغيرين المستقلين (S\*C)  $= 0.997$  وهي اكبر من مستوى المعنوية  $0.05$ . أما جدول تحليل البذور (S) التالي:

### Post Hoc Tests

S

#### Multiple Comparisons

Dependent Variable: P

Scheffe

(I) S	(J) S	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	.60	.542	.552	-.83	2.03
	3	-2.20*	.542	.002	-3.63	-.77
2	1	-.60	.542	.552	-2.03	.83
	3	-2.80*	.542	.000	-4.23	-1.37
3	1	2.20*	.542	.002	.77	3.63
	2	2.80*	.542	.000	1.37	4.23

Based on observed means.

\*. The mean difference is significant at the .05 level.

يتضح من خلال جدول تحليل المتغير S إن الصنف الثالث قد تفوق على الصنفين الآخرين وهذا ما يؤكد وجود علامة \* وان  $sig.$  بين الصنف الثالث والصنفين الآخرين اقل من  $0.05$  أي توجد فروق معنوية بين الصنف الثالث وكل من الصنفين الآخرين. أما جدول تحليل المتغير C الخاص بنوع السماد التالي:

C

## Multiple Comparisons

Dependent Variable: P  
Scheffe

(I) C	(J) C	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	.50	.542	.659	-.93	1.93
	3	-3.30*	.542	.000	-4.73	-1.87
2	1	-.50	.542	.659	-1.93	.93
	3	-3.80*	.542	.000	-5.23	-2.37
3	1	3.30*	.542	.000	1.87	4.73
	2	3.80*	.542	.000	2.37	5.23

Based on observed means.

\*. The mean difference is significant at the .05 level.

فهو الآخر يوضح إن الصنف الثالث من السماد قد تفوق على الصنفين الآخرين وهذا ما يؤكد وجود علامة \* وان sig. بين الصنف الثالث والصنفين الآخرين أقل من 0.05 أي توجد فروق معنوية بين الصنف الثالث وكل من الصنفين الآخرين.

ملاحظة: قبل أي تحليل لدراسة تحليل التباين من الأفضل اختبار ان توزيع المتغير التابع يتبع التوزيع الطبيعي وكذلك يجب أن تكون البيانات متجانسة بالنسبة للمتغيرات المستقلة (أي تكون التباينات متجانسة) قبل البدء بأي تحليل.

## تمرين 1 على الأمر : tow way ANOVA

في تجربة لدراسة تأثير إضافة كميات مختلفة من سماد النيتروجين (20،30،40 كغم/دونم) ومستويات مختلفة من احد المبيدات الحشرية ( 1% ، 2% ، 3%) في زيادة إنتاج محصول الحنطة، تم إجراء ثلاث معاملات لهذا الغرض وبأربع مكررات لكل معاملة وكانت نتائج التجربة كما يأتي:

المتوسط	مكرر 4	مكرر 3	مكرر 2	مكرر 1	المكررات	
					المعاملات	
15.75	19	15	17	12	مبيد 1%	المعاملة 1: 20 كغم سماد / دونم
32	34	30	33	31	مبيد 2%	
23.5	22	23	25	24	مبيد 3%	
25.75	29	25	27	22	مبيد 1%	المعاملة 2: 30 كغم سماد / دونم
42	44	40	43	41	مبيد 2%	
33.5	32	33	35	34	مبيد 3%	
40.75	44	40	42	37	مبيد 1%	المعاملة 3: 40 كغم سماد / دونم
57	59	55	58	56	مبيد 2%	
49.5	52	47	50	49	مبيد 3%	

المطلوب:

- 1- إجراء تحليل التباين واختبار معنوية الفروق بين المعاملات باستخدام اختبار F وبمستوى دلالة 0.05
- 2- في حالة ظهور فروق معنوية بين المعاملات باستخدام اختبار F، اختبر معنوية الفروق بين متوسط إنتاج كل معاملة مع بقية المعاملات باستخدام طريقة الفرق المعنوي الأصغر LSD وبمستوى دلالة 0.05.
- 3- بأي معاملة من المعاملات السابقة تنصح المزارع باستخدامها ولماذا؟

**تمرين 2 على الأمر tow-way ANOVA:**

في تجربة لتغذية ثلاث سلالات من الحملان هي العواسي والحمداني والمستورد وللذكور والإناث، ظهرت النتائج كما في الجدول التالي، والمطلوب اختبار فرضية العدم التي تنص على عدم وجود فروق معنوية بين السلالات مقابل الفرضية البديلة ومعرفة أي من السلالات تفوقت على الأخرى تحت مستوى معنوية 5% فيما إذا تم رفض فرضية العدم والقبول بالفرضية البديلة وكيف تم معرفة ذلك مع حساب متوسط اوزان الذكور والإناث لكل سلالة.

فرضية العدم :

$$H_0: \mu w_1 = \mu w_2 = \mu w_3$$

الفرضية البديلة:

$$H_1: \mu w_1 \neq \mu w_2 \neq \mu w_3$$

السلالة A		الجنس B		تكرارات الاوزان W		
1	عواسي	1	ذكر	16	18	17
		2	انثى	15	13	13
2	حمداني	1	ذكر	20	21	20
		2	انثى	19	18	18
3	مستورد	1	ذكر	24	25	25
		2	انثى	23	22	21

**4- الأمر الرئيسي correlate (الارتباط):**

يعتبر الارتباط أحد المقاييس الإحصائية المهمة والمستخدمه بشكل واسع جدا والتي تستخدم لإيجاد العلاقة بين متغيرين أو أكثر ويعتبر معامل الارتباط لبيرسون Pearson من أهم المقاييس حيث يستخدم لإيجاد العلاقة بين المتغيرات الرقمية والتي تستخدم القياسات الكمية مثل العلاقة بين الطول والوزن وغيرها، أما في حالة الرتب Ranks والصفات أي المتغيرات الوصفية نستخدم اختبار Spearman أو اختبار Kendall والتي تستخدم لاستخراج معامل الارتباط بصورة تقريبية حيث من الضروري استخدام معامل الارتباط ( Kendall, Spearman ) في حالة إذا كان أحد مشاهدات المتغيرين أو كلاهما غير مقاسين (ليست متغيرات كمية) ولكن يمكن إعطائها رتبا تصاعديا أو تنازليا وفي هذه الحالة يتم إدخال الرتب المتناظرة للظاهرتين بدلا من القيم الأصلية. إن المقياس المستخدم الذي يقيس درجة الارتباط يعرف بمعامل الارتباط correlation coefficients وتراوح قيمته بين (1،-1) حيث كلما اقتربت قيمة معامل الارتباط من الواحد يدل على إن العلاقة بين المتغيرات قيد الدراسة قوية وإن الإشارة السالبة تدل على العلاقة العكسية والإشارة الموجبة تدل على العلاقة الطردية، أما إذا اقتربت قيمة معامل الارتباط من الصفر فهذا دليل على ضعف العلاقة بين المتغيرات قيد الدراسة.

وإن هذا الأمر يحتوي على عدة أوامر فرعية منها:

\* الأمر bivariate: هذا الأمر خاص بحساب معامل الارتباط الخطي البسيط simple linear correlation, يحسب معامل الارتباط الخطي البسيط بافتراض وجود علاقة بين متغيرين اثنين فقط مع العلم إن الحصول على قيمة صغيرة لهذا المعامل لا يعني عدم وجود علاقة بين المتغيرين فقد توجد علاقة من الدرجة الثانية أو الثالثة (ارتباط غير خطي) يمكن الوصول للأمر الذي يحسب الارتباط الخطي البسيط كما يأتي:

Analyze → correlate → bivariate

فيظهر مربع الحوار التالي:





فننقل المتغيرين من جهة اليسار إلى جهة اليمين ونأشر خانة Pearson لحساب معامل الارتباط البسيط أما إذا أردنا إيجاد معامل ارتباط الرتب فنأشر خانة spearman كما نؤشر خانة two-tailed لاختبار الفرضية من الطرفين كما نؤشر خانة flag significant correlations لوضع نجمة للارتباطات المعنوية كما موضح في الصورة أعلاه.

### مثال على حساب معامل الارتباط الخطي البسيط:

البيانات التالية تمثل درجات 10 طلاب في مادة الرياضيات ومادة اللغة وهي كما يأتي:

Lang:60,68,60,74,80,84,80,72,62,82

Math:56,60,64,82,76,72,74,66,64,86

المطلوب:

1- إدخال البيانات في data editor لبرنامج spss

2- اوجد معامل الارتباط الخطي البسيط Pearson

3- اختبار الفرضية من طرفين

4- تعليم الارتباطات المعنوية

5- حلل النتائج


حل المثال

نرتب البيانات في data editor كما في الجدول الآتي:

lang	math
60	56
68	60
60	64
74	82
80	76
84	72
80	74
72	66
62	64
82	86

Analyze → correlate → bivariate

فيظهر صندوق الحوار الخاص بهذا الأمر فننقل المتغيرين من جهة اليسار إلى جهة اليمين ونأشر خانة Pearson وخانة two-tailed وكذلك خانة flag significant correlations كما في الصورة التالية:



بعد ذلك ننقر مفتاح OK فتظهر النتائج كما في الصورة أدناه:

## → Correlations

Correlations

		LANG	MATH
LANG	Pearson Correlation	1	.776**
	Sig. (2-tailed)	.	.008
	N	10	10
MATH	Pearson Correlation	.776**	1
	Sig. (2-tailed)	.008	.
	N	10	10

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

تحليل النتائج: بلغ معامل الارتباط 0.776 وان هذا الرقم يقترب من الواحد وهذا يدل على الارتباط القوي بين المتغيرين وبما إن الإشارة موجبة فهذا يدل على العلاقة بين المتغيرين علاقة طردية أي كلما ارتفعت درجة إحدى المواد ترتفع معها درجة المادة الأخرى والعكس صحيح.

تمارين على الأمر Correlation

### تمرين 1:

البيانات التالية تمثل طول النبات (lo) وعدد التفرعات (not) كما تظهر في ورقة data view لبرنامج SPSS كما يأتي:

lo	not
38	8
42	10
20	3

46	12
25	5
22	3
48	14
30	6
53	15
36	6

المطلوب ما يأتي:

- 1- اوجد معامل الارتباط الخطي البسيط لـ (Pearson)
  - 2- اختبار المعنوي من اتجاهين
  - 3- وضع علامة \* في حالة كون الارتباط الخطي البسيط معنوي تحت مستوى معنوية 5%
  - 4- حساب المتوسط والانحراف المعياري
  - 5- هل الارتباط طردي أم عكسي وكيف تستدل على ذلك؟
  - 6- هل نقبل فرضية العدم أم نرفضها ولماذا؟
- H0:p=0                      فرضية العدم  
H1:p≠0                      الفرضية البديلة

## تمرين 2:

البيانات التالية تمثل تركيز احد المبيدات (Ms) في مكافحة إحدى الافات الزراعية ونسبة الاصابة بعد المكافحة (Pr) كما تظهر في ورقة data view لبرنامج SPSS كما يأتي:

Ms	Pr
.020	.05
.013	.65
.018	.31
.016	.50
.012	.71
.014	.6
.010	.85
.017	.41
.019	.15
.015	.57

المطلوب ما يأتي:

- 1- اوجد معامل الارتباط الخطي البسيط لـ (Pearson)
  - 2- اختبار المعنوي من اتجاهين
  - 3- وضع علامة \* في حالة كون الارتباط الخطي البسيط معنوي تحت مستوى معنوية 5%
  - 4- حساب المتوسط والانحراف المعياري
  - 5- هل الارتباط طردي أم عكسي وكيف تستدل على ذلك؟
  - 6- هل نقبل فرضية العدم أم نرفضها ولماذا؟
- H0:p=0                      فرضية العدم  
H1:p≠0                      الفرضية البديلة

**تمرين 3:**

البيانات التالية تمثل نسبة الملوحة في التربة (ديسي سمنز/م) (Ec) وكمية الإنتاج لمحصول الشعير (Pro) كما تظهر في ورقة data view لبرنامج SPSS كما يأتي:

Ec	Pro
.75	25
.30	23
.10	20
.55	23
.40	24
.80	23
.20	25
.50	26
.70	25
.85	25

المطلوب ما يأتي:

- 1- اوجد معامل الارتباط الخطي البسيط لـ (Pearson)
  - 2- اختبار المعنوي من اتجاهين
  - 3- وضع علامة \* في حالة كون الارتباط الخطي البسيط معنوي تحت مستوى معنوية 5%
  - 4- حساب المتوسط والانحراف المعياري
  - 5- هل الارتباط طردي أم عكسي وكيف تستدل على ذلك؟
  - 6- هل نقبل فرضية العدم أم نرفضها ولماذا؟
- H0:p=0                      فرضية العدم  
H1:p≠0                      الفرضية البديلة

**تمرين 4:**

البيانات التالية تمثل كمية السماد الكيماوي (Fr) وكمية الإنتاج لأحد المحاصيل (Pro) كما تظهر في ورقة data view لبرنامج SPSS كما يأتي:

Fr	Pro
5.0	102
3.5	74
5.5	120
2.5	55
4.0	83
6.0	133
2.0	50
3.0	65
4.5	91
6.5	140

المطلوب ما يأتي:

- 1- اوجد معامل الارتباط الخطي البسيط لـ (Pearson)
- 2- اختبار المعنوي من اتجاهين
- 3- وضع علامة \* في حالة كون الارتباط الخطي البسيط معنوي تحت مستوى معنوية 5%

4 - حساب المتوسط والانحراف المعياري

5 - هل الارتباط طردي أم عكسي وكيف تستدل على ذلك؟

6 - هل نقبل فرضية العدم أم نرفضها ولماذا؟

H0:p=0 فرضية العدم

H1:p≠0 الفرضية البديلة

**5- الأمر الرئيسي Regression (الانحدار):**

يستخدم هذا الأمر الأيجاد الانحدار بين متغير تابع واحد ومتغير مستقل واحد ويسمى نموذج الانحدار البسيط simple Regression model أو بين متغير تابع واحد وأكثر من متغير مستقل فيسمى عند ذلك بنموذج الانحدار المتعدد multiple Regression model وهناك نوعان من الانحدار الأول يسمى النموذج الخطي linear model والثاني يسمى النموذج غير الخطي non linear model وسوف تقتصر دراستنا على نموذج الانحدار الخطي البسيط simple linear Regression model حيث يأخذ هذا النموذج الصيغة العامة التالية:  $\hat{Y}=B_0+B_1X\pm e$

حيث:

 $\hat{Y}$  = المتغير التابع المحسوب


X = المتغير المستقل

B0 = الحد الثابت constant أو نقطة تقاطع خط الانحدار مع المحور الصادي (Y-axis) في الرسم البياني

B1 = معامل الانحدار (معامل المرونة) أي مقدار التغير في قيمة Y عندما تتغير قيمة X بمقدار وحدة واحدة

e = الخطأ العشوائي

وان المخطط التالي يبين أنواع النماذج الخاصة بالانحدار (Regression)



## مثال:

في دراسة لمعرفة اثر التغير في تكاليف إنتاج (cost) لأحد المحاصيل الزراعية على اسعاره (price) تم الحصول على البيانات التالية:

COST	PRICE
511	610
400	605
266	410
560	744
456	641
167	302
602	793
357	521
211	384
306	483

المطلوب:

- أ - استخرج معامل التحديد  $R^2$  واختبر جودة نموذج الانحدار الخطي  
 ب - استخرج جدول تحليل التباين ANOVA واختبر معنوية النموذج من خلال اختبار F  
 ت - اوجد معادلة الانحدار علما ان المتغير المستقل يرمز له بالرمز X والمتغير التابع بالرمز  $\hat{Y}$   
 ث - اختبر فرضية العدم لكل من معلمتي الانحدار  $B_0, B_1$  من خلال اختبار t تحت مستوى معنوية 5% و 1%

H0:  $B_0, B_1=0$  فرضية العدم  
 H1:  $B_0, B_1 \neq 0$  الفرضية البديلة

الحل:

1 - من شريط القوائم نختار

Analyze → Regression → Linear

2 - فيظهر مربع Linear Regression حيث نقوم بنقل المتغير التابع (price) من جهة اليسار إلى

خانة Dependent والمتغير المستقل (cost) إلى خانة Independent(s)

3 - ننقر مفتاح Statistics فيظهر مربع الحوار الخاص به فنقوم بتأشير الخانات التالية:

أ - خانة Estimates: لتقدير معلمتي نموذج الانحدار الخطي وهي ( $B_0, B_1$ ) واختبارات t لهاب - خانة Model fit: لعرض معامل التحديد  $R^2$  وجدول تحليل التباين ANOVA

4 - عند النقر على مفتاح ok تظهر الجداول الخاصة بنتائج التحليل الإحصائي وهي :

أ - جدول Model Summary: يتضمن معامل التحديد  $R^2$  ويعتبر مقياسا لجودة النموذج وتكون

قيمته بين الصفر والواحد الصحيح، وان مقداره في مثالنا هو 0.962 وهذا يعني ان 96% من

التغير الذي يحدث لسعر السلعة يكون بسبب التكاليف وان 4% فقط من التغيرات في السعر

تكون بسبب متغيرات مستقلة أخرى لم تتناولها الدراسة.

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.981 <sup>a</sup>	.962	.958	32.578

a. Predictors: (Constant), COST

b. Dependent Variable: PRICE

ب- جدول تحليل التباين ANOVA: يشير إلى ان المعنوية (Sig.) الخاصة باختبار F بلغت (.000). وهذا يشير إلى معنوية معادلة الانحدار.

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	217085.405	1	217085.405	204.540	.000 <sup>a</sup>
	Residual	8490.695	8	1061.337		
	Total	225576.100	9			

a. Predictors: (Constant), COST

b. Dependent Variable: PRICE

ت جدول Coefficients:

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	147.457	29.927		4.927	.001
	COST	1.048	.073	.981	14.302	.000

a. Dependent Variable: PRICE

وهو الجدول الذي يمكن من خلاله كتابة معادلة الانحدار الخطي كذلك اختبار معنوية معلمتي النموذج (B0,B1) وان معادلة الانحدار الخطي هي كما يأتي:

$$\hat{Y} = B_0 + B_1X$$

$$\hat{Y} = 147.457 + 1.048X$$

$$(29.927) \quad (.073)$$

ان المعادلة السابقة تعني عند زيادة تكاليف إنتاج هذا المحصول بمقدار وحدة واحدة فان سعر المحصول سوف يزداد بمقدار 1.048، اما الارقام داخل الاقواس تحت معلمتي النموذج فتمثل مقدار الخطأ المعياري لهما .

ث -ايضا من خلال الجدول أعلاه يمكن اختبار فرضية العدم لمعلمتي النموذج (B0,B1) حيث يلاحظ ان المعنوية (sig.) لاختبار t لمعلمتي النموذج (B0,B1) هي اقل من 0.01 مما يشير إلى رفض فرضية العدم والقبول بالفرضية البديل وهذا يؤكد على معنويتهما تحت مستوى 5% و 1%.

**تمرين 1:**

في دراسة لمعرفة اثر التغير في أسعار (price) احد المحاصيل الزراعية على حجم الطلب (demand) عليه، تم الحصول على البيانات التالية:

PRICE	DEMAND
16	253
21	245
27	192
15	260
19	244
31	190
12	255
23	199
30	188
26	202

المطلوب:

أ - استخرج معامل التحديد  $R^2$  واختبر جودة نموذج الانحدار الخطي

ب - استخرج جدول تحليل التباين ANOVA واختبر معنوية النموذج من خلال اختبار F

ت - اوجد معادلة الانحدار علما ان المتغير المستقل يرمز له بالرمز X والمتغير التابع بالرمز  $\hat{Y}$

ث - اختبر فرضية العدم لكل من معلمتي الانحدار  $B_0, B_1$  من خلال اختبار t تحت مستوى معنوية 5% و 1%

$$H_0: B_0, B_1=0$$

فرضية العدم

$$H_1: B_0, B_1 \neq 0$$

الفرضية البديلة

**تمرين 2:**

في دراسة لمعرفة اثر التغير في تكاليف المواد الاولية ( $X_1$ ) وأجور العمل ( $X_2$ ) لأحد المحاصيل الزراعية على اسعاره (p) تم الحصول على البيانات التالية:

p	X1	X2
301	102	123
610	275	314
320	112	141
550	267	282
351	119	173
500	199	251
395	131	192
465	174	235
410	141	211
430	163	223

المطلوب:

أ - استخرج معامل التحديد  $R^2$  واختبر جودة نموذج الانحدار الخطي



ب - استخراج جدول تحليل التباين ANOVA واختبر معنوية النموذج من خلال اختبار F  
ت - اوجد معادلة الانحدار علما ان المتغيران المستقلان يرمز لهما بالرمز X1 و X2 والمتغير التابع بالرمز  $\hat{Y}$   
ث - اختبر فرضية العدم لكل من معلمتي الانحدار B0, B1, B2 من خلال اختبار t تحت مستوى معنوية 5% و 1%

H0: B0, B1, B2=0      فرضية العدم  
H1: B0, B1, B2≠ 0      الفرضية البديلة

### تمرين على الأمر : regression

في إحدى التجارب لمعرفة هل يوجد ارتباط بين طول النبات ومساحة الورقة وكمية الإنتاج لمحصول دوار الشمس وما هي معادلة الخط المستقيم لهذه المتغيرات اذا علمنا بان متغير كمية الإنتاج هو المتغير التابع والمتغيران مستقلان هما كل من طول النبات ومساحة الورقة من خلال البيانات الاتية:

X2	X1	Y
مساحة الورقة	طول النبات	كمية الإنتاج
30	180	500
31	181	520
35	185	520
39	190	560
40	192	570
51	196	600

المطلوب:

أ - استخراج معامل التحديد  $R^2$  واختبر جودة نموذج الانحدار الخطي  
ب - استخراج جدول تحليل التباين ANOVA واختبر معنوية النموذج من خلال اختبار F  
ت - اوجد معادلة الانحدار علما ان المتغيران المستقلان يرمز لهما بالرمز X1 و X2 والمتغير التابع بالرمز  $\hat{Y}$   
ث - اختبر فرضية العدم لكل من معلمتي الانحدار B0, B1, B2 من خلال اختبار t تحت مستوى معنوية 5% و 1%

H0: B0, B1, B2=0      فرضية العدم  
H1: B0, B1, B2≠ 0      الفرضية البديلة

**خامسا :- أوامر القائمة Graphs:**

أوامر هذه القائمة مختصة في تمثيل قيم المتغيرات على شكل رسوم بيانية مختلفة الأشكال لغرض تحليلها وتفسيرها ووصفها وسوف نقتصر على خمسة منها هي:

1:- الأشرطة البيانية Bar charts: حيث يمكن تحويل قيم المتغير على شكل أعمدة وان كل عمود يمثل إحدى قيم المتغير حيث يكون المحور الأفقي ممثلاً للقيم والمحور العمودي ممثلاً للتكرارات. يمكن الوصول إلى هذا الأمر من خلال النقر على قائمة graphs ثم الأمر bar... فيظهر مربع حوار لتحديد نوع الرسم البياني ونختار منه النوع simple وننقر مفتاح define فيظهر مربع حوار خاص بهذا الأمر فننقل المتغير من جهة اليسار إلى خانة: category Axis: ومن ثم ننقر مفتاح ok فيظهر الرسم البياني في ملف output

2:- الشكل الخطي line charts: يقوم هذا الأمر بتحويل قيم المتغير على شكل خط بياني: يمكن الوصول إلى هذا الأمر من خلال النقر على قائمة graphs ثم الأمر line... فيظهر مربع حوار لتحديد نوع الرسم البياني ونختار منه النوع simple وننقر مفتاح define فيظهر مربع حوار خاص بهذا الأمر فننقل المتغير من جهة اليسار إلى خانة: category Axis: ومن ثم ننقر مفتاح ok فيظهر الرسم البياني في ملف output

3:- شكل المساحة area charts: يقوم هذا الأمر بتحديد مساحة في الشكل البياني حسب قيم المتغير يمكن الوصول إلى هذا الأمر من خلال النقر على قائمة graphs ثم الأمر area... فيظهر مربع حوار لتحديد نوع الرسم البياني ونختار منه النوع simple وننقر مفتاح define فيظهر مربع حوار خاص بهذا الأمر فننقل المتغير من جهة اليسار إلى خانة: category Axis: ومن ثم ننقر مفتاح ok فيظهر الرسم البياني في ملف output

4:- شكل القرص pie charts: يقوم هذا الأمر بتحويل قيم المتغير إلى شكل دائري مقسم إلى أجزاء كل جزء يمثل تكرارات كل قيمة من قيم المتغير.

يمكن الوصول إلى هذا الأمر من خلال النقر على قائمة graphs ثم الأمر pie... فيظهر مربع حوار لتحديد نوع الرسم البياني ونختار منه النوع summaries for groups of cases وننقر مفتاح define فيظهر مربع حوار خاص بهذا الأمر فننقل المتغير من جهة اليسار إلى خانة: category Axis: ومن ثم ننقر مفتاح ok فيظهر الرسم البياني في ملف output

5 :- المدرج التكراري histogram frequency: يقوم هذا الأمر بتقسيم المدى بين أقل قيمة وأكبر قيمة من قيم المتغير إلى مديات متساوية اصغر ومن ثمة يكون لكل مدى عمود يمثل عدد القيم الموجودة في هذا المدى.

يمكن الوصول إلى هذا الأمر من خلال النقر على قائمة graphs ثم الأمر histogram فيظهر مربع حوار نقوم بنقل المتغير من جهة اليسار إلى خانة: variable: ثم ننقر مفتاح ok فيظهر الرسم البياني في ملف output.

**مثال على أوامر القائمة Graphs:**


في إحدى التجارب لمعرفة تأثير مستويات الري ونسب رش المبيد على إنتاج محصول الحنطة فظهرت النتائج التالية والمطلوب إجراء الرسوم البيانية الخمسة في قائمة graphs والبيانات هي:

12, 14, 15, 17, 18, 20, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 18, 20, 18, 20, 18, 12, 20, 18, 17, 12, 20, 18, 17


حل المثال:

بعد إدخال البيانات في ورقة محرر البيانات نختار من قائمة في متغير باسم product نقوم بالاتي:


1- من قائمة graphs نختار الأمر bar... فيظهر مربع الحوار التالي:




نختار منة الخيار simple وننقر مفتاح Define فيظهر مربع الحوار التالي:




ننقل المتغير product من جهة اليسار إلى خانة category Axis ثم ننقر مفتاح ok فتظهر النتائج كما يأتي:



يلاحظ من هذا الشكل البياني إن المحور الأفقي مقسم بعدد القيم في المتغير والمحور العمودي مقسم بعدد التكرارات، وقد تم إعطاء عمود لكل قيمة يكون ارتفاعه حسب عدد تكرارات تلك القيمة.  
2- من قائمة graphs نختار الأمر line... ونكرر نفس الخطوات السابقة فتظهر النتيجة كما في الصورة الآتية:




يلاحظ من هذا الشكل البياني إن المحور الأفقي مقسم بعدد القيم في المتغير والمحور العمودي مقسم بعدد التكرارات، وقد تم توصيل خط مستقيم بين كل قيمة وأخرى وبذلك أخذ شكل خط متعرج.  
3- من قائمة graphs نختار الأمر Area... ونكرر نفس الخطوات السابقة فتظهر النتيجة كما في الصورة الآتية:




يلاحظ من هذا الشكل البياني إن المحور الأفقي مقسم بعدد القيم في المتغير والمحور العمودي مقسم بعدد التكرارات، وقد تم توصيل خط مستقيم بين كل قيمة وأخرى وبذلك أخذ شكل خط متعرج وتم تظليل المساحة الواقعة تحت الخط المتعرج.

4 - من قائمة graphs نختار الأمر Pie... فيظهر مربع حوار فنؤشر الخيار summaries for groups of cases ونكرر نفس الخطوات السابقة فتظهر النتيجة كما في الصورة الآتية:



يلاحظ من الشكل إن الدائرة قد قسمت بعدد قيم المتغير وإن مساحة كل جزء من الدائرة يتناسب وتكرارات تلك القيمة.

5 من قائمة graphs نختار الأمر Histogram... فيظهر مربع الحوار الخاص بهذا الأمر فنقوم بنقل المتغير product من جهة اليسار إلى خانة variable: ثم ننقر مفتاح ok فتظهر النتائج كما في الشكل الآتي:



يلاحظ إن هذا الشكل يشبه الشكل الأول (bar chart) ولكن يوجد اختلاف جوهري هو إن المحور الأفقي قد تم تقسيمه إلى فترات وليس على أساس القيم في المتغير وتم حساب عدد تكرارات القيم الواقعة في تلك الفترة إضافة إلى إعطاء بعض المعلومات الإضافية مثل الانحراف المعياري والمتوسط الحسابي وعدد القيم في المتغير.

وبذلك تكون قد انتهت المحاضرات الخاصة  
بالبرنامج الإحصائي SPSS

المصادر

- a. دليلك إلى البرنامج الإحصائي SPSS ، إعداد سعد ز غلoul بشير
- b. البرنامج الإحصائي SPSS، إعداد د. أسامة محمد جاسم القصاب
- c. البرنامج الإحصائي SPSS, v, 10.0، إعداد منى قمحي
- d. تحليل البرنامج الإحصائي SPSS، د. ايهاب عبد السلام محمود
- e. تحليل البيانات باستخدام SPSS 17.0، ماريجا نوروسيس